

茄科果菜類病蟲害防治用藥摘要表

茄科果菜類：番茄、甜椒、茄子、辣椒、枸杞、香瓜茄

高雄區農業改良場 1040924 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	本藥劑同時核准使用於其他 病蟲害防治
99%礦物油乳劑	FRAC NC	白粉病	500	--	免訂	兼防葉蟻類
50%白克列水分散性粒劑	FRAC 7,C2		2,500	7	未訂	
42.4%白克列水懸劑	FRAC 7,C2		2,100	7	未訂	
22.7%腈硫酰水懸劑	FRAC M9	炭疽病	700	4	1.0	易發生藥害，勿任意提高濃度或與其他藥劑混合使用。
23%亞托敏水懸劑	FRAC 1,B1		1,000	6(設施 12 天)	2.0	兼防白粉病
23.6%百克敏乳劑	FRAC 11,C3		3,000	6	0.5	
27.3%三氟得克利水懸劑	FRAC 11,C3 FRAC 3,G1		2,500	7	三氟敏 0.5 得克利 1.0	
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	細菌性斑點病	500	3	免訂	
53.8%氫氧化銅水分散粒劑			2,000	6	免訂	
61.4%氫氧化銅水分散性粒劑			1,500	--	免訂	
66.5%普拔克溶液	FRAC 28,F4	幼苗疫病	400	--	2.0	播種當日灌藥 1 次，發病時再灌藥 1 次。
50%達滅芬可濕性粉劑	FRAC 40,F5	疫病	4,000	6(設施 12 天)	0.5	
23%亞托敏水懸劑	FRAC 1,B1		1,000	6(設施 12 天)	2.0	兼防白粉病
17.7%安美速水懸劑	FRAC 21,C4		4,000	6(設施 12 天)	1.0	
250g/L 曼普胺水懸劑	FRAC 40,F5		2,500	15(設施 21 天)	1.0	
60.8%氟比拔克水懸劑	FRAC 43 FRAC 28		1,000	3	氟比來 0.02 普拔克 2.0	務必全株均勻噴施，包含莖基部。

1×10^7 cfu/g 蓋棘木黴菌可濕性粉劑			2,000	免訂	免訂	<p>1. 使用前 24-36 小時，先將本藥劑與水以 1:10 比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至 2,000 倍，每株澆灌 200 毫升。</p> <p>2. 定植前 7 天灌注植穴 1 次，定植當天再澆灌全株 1 次，共 2 次。</p> <p>3. 避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。</p> <p>4. 標示加註具呼吸中等毒。</p>
50%福多寧可濕性粉劑	FRAC 7,C2	白絹病	5,000	--	2.0	定植後每株灌注 200 公撮，15 天後再灌注一次。
50%撲滅寧可濕性粉劑	FRAC 2,E3	白絹病	2,000	--	2.0	同上
2.46%賽洛寧膠囊懸著液		毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	6	0.5	兼防薊馬類、蝶蛾類及葉蟻類
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A		1,000	6	0.5	兼防薊馬類、蝶蛾類及葉蟻類
2.8%賽洛寧乳劑			1,000	6	0.5	兼防薊馬類、蝶蛾類及葉蟻類
75%硫敵克可濕性粉劑	IRAC 1A		3,000	6	1.0	
35%白克松可濕性粉劑	IRAC 1B		3,000	15	0.5	
50%馬拉松乳劑	IRAC 1B		500	4	1.0	1. 番茄幼苗對馬拉松較敏感。 2. 不可與鹼性藥劑混用。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液		葉蟻類	1,000	6	0.5	兼防薊馬類及蝶蛾類
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A		1,000	6	0.5	同上
2.5%賽洛寧微乳劑			1,000	6	0.5	同上
240g/L 賦派芬水懸劑	IRAC 23		2,000	4	未訂	
5%芬普蟻水懸劑	IRAC 21A	葉蟻類 細蟻類	1,000	9	0.01	避免與石灰硫礦合劑混合使用

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	本藥劑同時核准使用於其他 病蟲害防治
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B		800	10	1.0	兼防蝶蛾類
2.46%賽洛寧膠囊懸著液			1,000	6	0.5	兼防蝶蛾類及葉蟻類
2.8%賽洛寧乳劑			1,000	6	0.5	同上
2.5%賽洛寧微乳劑			1,000	6	0.5	同上
2.9%貝他-賽扶寧乳劑			1,500	9	0.5	兼防蝶蛾類
25%福化利乳劑			3,000	7	0.5	
9.6%益達胺溶液			2,000	6	0.5	兼防粉蟲類
9.6%益達胺水懸劑			2,000	6	0.5	同上
20%亞滅培水溶性粉劑			4,000	6(設施 12 天)	1.0	兼防粉蟲類
50%滅賜克可濕性粉劑			800	15	1.0	
2.5%賜諾殺水懸劑	IRAC 5		1,000	3	0.2	
20%覆滅蟎水溶性粉劑	IRAC 1A		400	9	2.0	1.兼防薊馬類、葉蟻 2.提高濃度可能引起藥害
10.4%貝賽益達胺水懸劑	IRAC3A IRAC 4A		2,000	6	賽扶寧 0.5 益達胺 0.5	兼防蝶蛾類、薊馬類
20%亞滅培水溶性粉劑	IRAC 4A	粉蟲類	4,000	6(設施 12 天)	1.0	兼防薊馬類
20%達特南水分散粒劑			3,000	3	0.5	兼防薊馬類
40.4%賽果培水懸劑			3,300	10	3.0	
2%阿巴汀乳劑	IRAC 6		1,000	12	0.02	兼防葉蟻類
8.9%賽滅淨溶液	IRAC 17	斑潛蠅類	1,000	12	0.5	
75%賽滅淨可濕性粉劑			4,000	12	0.5	
3%加福松微粒劑	IRAC 1B	切根蟲	--	--	0.1	限定植前施藥
5%陶斯松粒劑			--	6	0.5	