

花卉蟲害

● 陳仁昭



斜紋夜蛾

為雜食性害蟲，為害菊花、玫瑰、唐菖蒲、夜來香、金魚草、非洲菊、火鶴花、大理花、滿天星、康乃馨、洋桔梗、蘭花及很多作物。一年發生 8~10 代，雨季較少，初孵化幼蟲群集葉片上，稍大時四處分散，白天潛伏土中，夜間爬上植株，取食葉片或花瓣。

斜紋夜蛾成虫



大避債蛾



大避債蛾

為害玫瑰、茉莉、榕樹、楓香、鳳凰木、松、肯氏南洋杉等多種木本植物。幼蟲以絲及碎葉或枝條成蓑巢藏於其內，雄蛾翅暗褐色，雌蛾無翅，腳亦退化。

害蟲防治

非洲菊斑潛蠅

被害植物有非洲菊、大理花、萬壽菊、大波斯菊、矢車菊、瓜葉菊、滿天星、洋桔梗、孔雀菊。

本蟲為近幾年來新侵入之害蟲，一年發生21世代，幼蟲鑽食葉肉，造成灰白色隧道。老熟幼蟲自葉內鑽出，在葉面或土中化蛹。

防治法

1. 以黃色粘板誘捕成蟲。
2. 選用下列一種藥劑防治：賽滅淨（汽嘉讚）為荷爾蒙類

青枯夜蛾

為害玫瑰、山茶、楓香、幼蟲體長可達10公分，體上密佈刺毛。雄蛾淡綠色、雌蛾黃綠色。

青枯夜蛾




甜菜夜蛾

為害菊花、洋桔梗、金魚草、康乃馨、石竹、滿天星、星辰花、唐菖蒲、夜來香……等，一年發生十代以上，為害葉片及花器，並常鑽入花蕾內。

蛾類防治法

1. 斜紋夜蛾可用“性費洛蒙”誘殺
2. 保護寄生蜂
3. 摘除卵塊
4. 誘蛾燈燈光誘殺
5. 藥劑防治，目前無正式推薦於花卉之殺蟲劑，可試用陶斯松、三氯松、加保利、蘇力菌等藥劑。

小白紋毒蛾



小白紋毒蛾

為植物很多，包括玫瑰、菊花、非洲菊、大理花、美女櫻、山茶、唐菖蒲等。一年發生約8代，幼蟲密佈毒毛，沾上皮膚會引起紅疹並發癢，幼蟲取食葉片及花。

台灣黃毒蛾

為害習性類似小白紋毒蛾。

台灣刺蛾 *Phlossa conjuncta* (Walker)

為害玫瑰、白？等，體扁、側面有毒刺，皮膚碰觸有如蜂螯，疼痛又灼熱紅腫宜小心。