

# 蓮霧生產、加強套袋技術

■ 藍啓倩

蓮霧是高屏地區最重要經濟果樹，83年度高屏兩縣栽培面積有8,017公頃，約佔全省90%，品佳質優，聲名遠播，而有黑珍珠、黑鑽石等美譽。但是，蓮霧果實發育期間，常發生各種不同的損害，如炭疽病、疫病、果腐病、東方果實蠅、金龜子、薊馬、粉介殼蟲及鳥害、寒害，機械傷害（擦傷）等，不過本文僅就果實套袋加以討論。

## 蓮霧套袋優點

可以防治病蟲害及鳥害、減少雨水及低溫等天然災害，防日曬、防藥害、農藥污染與殘毒，減少外界機械傷害。無灰塵附著，提高商品價值，並可使果實發育良好，糖度上升，果實增大，色澤亮麗，降低用藥成本。讓消費者安心食用，提高市場競銷能力，增加果農收益。

## 套袋實施步驟

**套袋質材：**採用防病、防蟲、透氣或透光、有排水孔、不怕雨水或藥劑淋濕之紙袋。

**套袋適期：**幼果期（吊鐘期）。

**植株病蟲害防治：**套袋前，先徹底實施病蟲害防治施藥工作。

**病害防治：**從開花盛期就要開始，約在套袋前7天再施藥2次，然後進行套袋。施藥時，針對樹幹、枝條、果實、葉片、地面等部位都要進行噴施。炭疽病防治藥劑如下：(1)50%撲克拉錳可濕性粉劑、稀釋4000倍，(2)53%腐絕快得寧可濕性粉劑、稀釋1200倍，(3)56%貝芬硫醃可濕性粉劑、稀釋1000倍，(4)43%嘉賜貝芬可濕性粉劑、稀釋1000倍。

任擇一種使用。

蟲害防治工作應從新梢期、開花期就開始，防治腹鈎薊馬藥劑如下：(1)40%加保福化利可濕性粉劑稀釋2000倍，(2)25%福化利乳劑稀釋3000倍，(3)2.8%賽洛寧乳劑稀釋2000倍，(4)2.8%第滅寧乳劑稀釋1500倍，(5)3%亞滅寧乳劑稀釋1000倍，(6)48.34%丁基加保扶乳劑稀釋1500倍。任擇一種使用。



套袋蓮霧色澤亮麗果實增大

**紙袋之準備：**(1)套袋前一晚，浸濕紙袋口5公分部分。(2)浸軟後甩去多餘水分，袋口朝上，成束直立放置，上覆濕布或不透氣塑膠布。

**套袋方法：**(1)配合疏果作業，每個紙袋內至多留5~7粒果實。每顆樹最多套200~250個紙袋，即依樹齡大小而予以增減。(2)套袋後將開口之鐵線旋緊，以避免水分進入，而感染病菌。但是，要注意施藥後之植株，必須在藥液吹乾後，始可套袋。最好1日內全部套袋完畢，不要超過2日。未套完之植株需重新施藥防治，才套袋。如噴藥後遇雨，則需重新施藥。

近年來，消費者十分重視食品安全衛生，政府的宣導亦不遺餘力，而蓮霧果皮又被直接食用，故高商品價值蓮霧的套袋保護，已成必然趨勢。果農務必全面配合實施，才能維持蓮霧「果品之王」地位，及最高商品價值。