



大胡瓜新品種，又大又綠。

10月17日在高樹鄉田子國小旁，舉辦了一場大胡瓜新品種台農一號介紹觀摩會，參加的農民及推廣試驗人員超過100人，場面熱烈。

觀摩會由本場林場長主持，他表示：屏東地區如高樹、里港、九如、鹽埔、海豐等地是瓜果類蔬菜的產地，大胡瓜亦是其主要種植栽培的蔬菜，而新品種台農一號的問世，使得農民朋友有了更好的選擇。此作物由農試所楊偉正先生育成，現就其優缺點及栽培環境介紹如下：

優點：1.早熟，春作 44-45天採收，秋作 47-49天採收。2.早產，採收前七天產量較一般栽培品種為高。3.果形美觀，果實較一般黑皮系統胡瓜為長，果心較小。4.一節上少有著生二朵雌花。5.相對失水率低，貯藏性較強。6.抗胡瓜嵌紋病毒和木瓜輪點病毒—西瓜系統。7.耐矮南瓜黃化嵌紋病毒、露菌病和白粉病。

缺點：高溫期之大胡瓜果實顏色為淡綠色。

大胡瓜 新品種台農一號成果示範

◆陳明昭

適種適期：中部地區 3 月上旬至 4 月下旬，8 月下旬至 10 月中旬，南部地區 2 月中旬至 4 月下旬，8 月下旬至 10 月中旬。

適植地區：中部以南地區，以砂質壤土或壤土較適合種植，但是要避免連作。

栽培密度：行距1~1.2公尺，株距40~50公分，每0.1公頃約2,000株。

栽培管理：採立支柱或網架栽培，主蔓應隨時牽引縛繫在支柱或網架上。摘除主蔓 4 節以內所發生的果實及側蔓，僅留主蔓在第 5 節以上的果實，其側蔓可在雌花形成後的上方留一葉，並摘心。

肥料管理：每分地的有機肥用量約2,000~3,000公斤，在整地開溝時一次施用為原則，氮、磷、鉀元素的化學肥料需要量為30-16-20公斤。

病蟲害防治：台農 1 號為耐病毒病、露菌病和白粉病品種，可視發病情形而減少噴藥次數，其他病蟲害之防治，應注意生育期間發生情況，依據「植物保護手冊」推薦方法，適時進行防治。



林場長主持觀摩會



示範農戶種植田