



新聞資料

行政院農業委員會高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 108048 號

中華民國 108 年 10 月 24 日

紅豆栽培季乾爽 小心薊馬來擾亂

目前高屏地區紅豆已近開花期，加上秋風漸起氣候乾爽，極適合薊馬繁殖生長，高雄區農業改良場（以下簡稱高雄場）籲請農友注意防範紅豆薊馬類害蟲的危害。一旦發現薊馬，應立即選用賜諾特、畢芬寧或佈飛松等藥劑防治，以遏止蟲害蔓延，避免影響到豆莢品質與產量。

高雄場戴順發場長表示，危害紅豆的薊馬種類有南黃薊馬、豆花薊馬及臺灣花薊馬等。此類害蟲微小，群集於新梢，並在未展開新葉及花器上吸食汁液，在新梢上造成褐色斑點或落葉，花器被危害常導致皺縮乾枯，使豆莢變小或畸形捲曲無法成夾。此類害蟲於乾燥季節易大量發生，嚴重影響紅豆的品質與產量，務必在發生初期立即防範，以避免密度大量攀升後難以壓制。

戴場長進一步籲請農友應隨時注意田區中薊馬的族群動態，若能在蟲口密度較低時就注意防範，則可降低果莢受害率。在紅豆園區周遭懸掛黃色黏紙除可誘殺薊馬成蟲外，亦可隨時監測其族群密度，或以手掌輕拍新梢使蟲體掉落在掌心，亦可檢視薊馬發生量。利用藥劑防治時，盡量選用不同作用機制的藥劑(如克凡派、賜諾特、亞滅培、畢芬寧及佈飛松等，皆為不同作用機制藥劑)輪替使用，以避免抗藥性產生。農友如有防治上疑問，請逕洽高雄場，技術人員將竭誠為您提供服務。

聯絡人：陳明吟 助理研究員

電話：08-7746758



薊馬危害造成葉片皺縮捲曲



果莢被薊馬銼吸的受害狀



花苞內的豆花薊馬成蟲



正在危害果莢的薊馬若蟲