

農友信箱

問：常年種植蔬菜一直連作到翌年春季蔬菜時有萎縮病株（瘋穢）發生，產量低，價格又差有什麼方法可改進？（梓官／蔬菜班）

答：與農會及產銷班長連繫，利用蔬菜長期連作障礙土壤酸化，生育不良，銷售價格也不好之情況下，建議每年二月間集團轉作毛豆，一方面確保收益，另外收穫後殘株可當綠肥用，改良土壤理化性利於夏季蔬菜種植。

問：茄子開花後不久，長大約有3~5分時，易受蟲子危害，造成茄子有蛀孔，應如何防治？（里港／鍾顯連）

答：因鑑定為蕃茄夜蛾幼蟲蛀食果肉，且有扁蝸危害，建議可利用40%加芬賽寧可濕性粉劑2500倍，或90%納乃得可濕性粉劑3000倍噴灑防治。至於扁蝸可利用6%聚乙醛粒劑灑於畦溝周圍防治。

問：文心蘭花苞易受蜘蛛之危害，造成花苞掉落及破裂如何防治？（竹田／陳文昌）

答：因文心蘭種植於簡易網室內，適合於各種以蟲子生存，蜘蛛亦不例外，可選用曹蟪或合賽芬普寧施用殺死其卵，以減少其數目。

問：捲葉山蘇患細菌性病害，如何防治？（內埔／蘇永清）

答：1. 捲葉山蘇種植時須注意栽培環境不可過濕，日照不可太弱。
2. 建議勿栽植於文心蘭植床下，並改置較乾燥之地點，種植時使用殺菌劑（鏈黴素類）防治。


問：印度棗著果初期經常感染白粉病，果皮粗糙或畸型果，毫無經濟價值

可言，目前是否有較好藥劑可提供使用？（阿蓮／蔡正忠）

答：根據印度棗白粉病防治效果田間試驗，計有40%護矽得藥劑8000倍、20.8%比分諾乳劑4000倍、5%菲克利水懸粉3000倍、10.8%平克座乳劑3000倍效果不錯，可任選一種於幼期施藥防治3-4次。

問：去年印度棗“珠粒果”嚴重，如何防止，何以會發生？（里港／黃文章）

答：印度棗“珠粒果”有兩項情形，一若正常果實結果率不錯，則珠粒果較不消耗養分，屬正常調節。二若正常果沒有，則珠粒果屬非正常狀態。其原因可能是去年營養生長期連續陰雨，開花期颱風豪雨為害，造成植株樹勢衰落，養份不足，花粉發芽力弱，致授粉不良，造成死胚，而形成珠粒果。△



茄子受扁蝸危害



蕃茄夜蛾