

豆菜類病蟲害防治用藥摘要表

高雄區農業改良場 1041104 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	防治病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	同時核准使用於防治 其他病蟲害
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,000	3	1.0	1.兼防粉蟲類、薊馬類、葉蟻類、夜蛾類及葉蟬類。 2.禁止使用於豆苗。
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,000	3	1.0	同上
25%福化利乳劑	IRAC 3A	薊馬類	3,000	7	0.5	兼防蚜蟲類。
2.9%貝他-賽扶寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,500	9	0.5	兼防葉蟬類。
2.5%賜諾殺水懸劑	IRAC 5	薊馬類	1,000	3	0.3	兼防蝶蛾類。 對蜜蜂毒性高。
11.6%賜諾殺水懸劑	IRAC-5	薊馬類	4,500	3	0.3	同上
80%賜諾殺可濕性粉劑	IRAC-5	薊馬類	32,000	3	0.3	同上
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	薊馬類	800	10	1.0	1.兼防潛蠅類、金花蟲及蝶蛾類。 2.對蜜蜂具微毒性。 3.限結莢前使用。
20%亞滅培水溶性粉劑	IRAC 4A	薊馬類	4,000	6	1.0	可兼防蚜蟲類、薊馬類及葉蟬類。
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	3	1.0	1.兼防粉蟲類、蚜蟲類、葉蟻類、夜蛾類及葉蟬類。 2.禁止使用於豆苗。
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	3	1.0	同上
9.6%益達胺溶液	IRAC 4A	薊馬類	1,500	9	0.5	1.兼防蚜蟲類、薊馬類及葉蟬類。 2.對蜜蜂毒性高。
9.6%益達胺水懸劑	IRAC 4A	薊馬類	1,500	9	0.5	同上

藥劑名稱	作用機制 代碼	防治病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	同時核准使用於防治 其他病蟲害
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	2,000	3	1.0	1.兼防葉蠅類、蚜蟲類、斑潛蠅類、葉蟬類及薊馬類。 2.豆莢採收前3天停止施藥、豆苗採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	薊馬類	2,000	3	1.0	同上
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	薊馬類	2,000	3	1.0	同上
20%達特南水溶性粒劑	IRAC 4A	粉蟲類	3,000	9	0.5	1.可兼防蚜蟲類、粉蟲類、薊馬類。 2.對蜜蜂毒性高。
28.8%益達胺溶液	IRAC 4A	粉蟲類	4,500	21	0.5	1.兼防蚜蟲類、薊馬類及葉蟬類。 2.對蜜蜂毒性高。
9.6%益達胺溶液	IRAC 4A	粉蟲類	1,500	9	0.5	同上
9.6%益達胺水懸劑	IRAC 4A	粉蟲類	1,500	9	0.5	同上
25%派滅淨可濕性粉劑	IRAC 9B	粉蟲類	2,000	21	0.5	兼防蚜蟲類及葉蟬類。
20%畢達本可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蠅類	3,000	14	0.4	對蜜蜂毒性高。
18.5%大克蠅可濕性粉劑	IRAC UN	赤葉蠅	500	7	0.5	本藥劑試驗時加展著劑 Bivert 4,000倍。
35%大克蠅可濕性粉劑	IRAC UN	赤葉蠅	950	7	0.5	本藥劑試驗時加展著劑 Bivert 4,000倍。
35%芬佈克蠅可濕性粉劑	IRAC 12B IRAC UN	赤葉蠅	500	7	芬佈賜 未訂 大克蠅 0.5	本藥劑試驗時加展著劑 Bivert 4,000倍。
25%新殺蠅乳劑	IRAC UN	細蠅類	500	14	0.02	禁止使用於毛豆。
50%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A	蝶蛾類	1,000	7	0.5	兼防葉蟬類、薊馬類、椿象類、夜蛾類及毒蛾類。
85%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A	蝶蛾類	1,700	7	0.5	同上。

50%馬拉松乳劑	IRAC 1B	蝶蛾類	500	4	2.0	1.兼防薊馬類、蚜蟲類、植食性瓢蟲類、葉蟬類、介殼蟲類及蝶蛾類。 2.幼苗對馬拉松較敏感。 3.不可與鹼性藥劑混用、溫室栽培避免使用。
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	蝶蛾類	2,000	3	1.0	1.兼防葉蟬類、蚜蟲類、斑潛蠅類、葉蟬類及薊馬類。 2.豆莢採收前3天停止施藥、豆苗採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	蝶蛾類	2,000	3	1.0	同上
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	蝶蛾類	2,000	3	1.0	同上
40%賽速安勃水分散性粒劑	IRAC 4A IRAC-28	蝶蛾類	5,000	6	賽速安 0.01 剋安勃 0.5	
300 g/l 賽速安勃水懸劑	IRAC 4A IRAC-28	蝶蛾類	4,000	6	賽速安 0.01 剋安勃 0.5	
44.9%陶斯松乳劑	IRAC 1B	蝶蛾類	1,000	16	0.03	兼防蚜蟲類、薊馬類、粉蟲類、潛蠅類。
10%克凡派水懸劑	IRAC-13	蝶蛾類	1,000	18	0.5	1.兼防薊馬類及葉蟬類。 2.限豌豆使用。 3.對蜜蜂毒性高。
5%因滅汀水溶性粒劑	IRAC 6	蝶蛾類	3,500	3	0.02	
2.15%因滅汀乳劑	IRAC 6	蝶蛾類	1,500	3	0.02	
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	蝶蛾類	800	10	1.0	1.兼防潛蠅類、金花蟲及薊馬類。 2.對蜜蜂具微毒性。 3.限結莢前使用。
10%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC-3A	蝶蛾類	3,000	9	0.5	
5%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC-3A	蝶蛾類	1,500	9	0.5	

藥劑名稱	作用機制 代碼	防治病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	同時核准使用於防治 其他病蟲害
5%賽滅寧水基乳劑	IRAC-3A	蝶蛾類	1,500	9	0.5	
18.4%剋安勃水懸劑	IRAC-28	蝶蛾類	2,500	6	0.5	
35%剋安勃水分散性粒劑	IRAC-28	蝶蛾類	5,000	6	0.5	
甜菜夜蛾核多角體病毒水懸劑	非農藥資材	甜菜夜蛾	3,000	免訂	免訂	
10%福瑞松粒劑	IRAC 1B	潛蠅類	10 公斤/公頃	種植前使用	0.05	可兼防蚜蟲類及葉蟻類
8.9%賽滅淨溶液	IRAC 17	潛蠅類	1,000	7	1.0	
75%賽滅淨可濕性粉劑	IRAC 17	潛蠅類	6,000	7	1.0	
8.9%賽滅淨溶液	IRAC 17	潛蠅類	1,000	7	1.0	
33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3	銹病	400	12	豆菜 2.5	1.高溫多溼下易藥害。 2.避免與石灰硫礦合劑 混合使用。
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7 FRAC 11	銹病	1,500	9	白克列 1.0 百克敏 0.5	禁止使用於豆苗。
30%三得寧乳劑	FRAC 5 FRAC 3	銹病	1,000	4	三得芬 1.0 賽福寧 0.5	
75%嘉保信可濕性粉劑	FRAC 7	銹病	1,500	6	5.0	
50%脫克松可濕性粉劑	FRAC 14	立枯病	0.5 公克/公斤 種子	拌種時施用	未訂	限豌豆拌種時施用。
24.9%待克利乳劑	FRAC 3	角斑病	3,000	3	1.0	兼防白粉病、豇豆煤黴病
24.9%待克利水懸劑	FRAC 3	角斑病	3,000	3	1.0	兼防白粉病、豇豆煤黴病
23%三泰隆乳劑	FRAC 3	煤黴病	3,000	3	2.0	苗期禁止使用。
23%三泰隆水分散性乳劑	FRAC 3	煤黴病	3,000	3	2.0	
62.5%賽普護汰寧水分散性 粒劑	FRAC 9 FRAC 12	灰黴病	2,000	14	賽普洛 0.5 護汰寧 0.3	兼防炭疽病。
37.4%派美尼水懸劑	FRAC 9	灰黴病	1,500	14	1.0	

50%撲滅寧可濕性粉劑	FRAC E3	白絹病	1200	14	2.0	1.兼防白粉病 2.限結莢前使用
15%福多寧乳劑	FRAC-7	白絹病	900	14	未訂	
20%福多寧水懸劑	FRAC-7	白絹病	1,200	14	未訂	
50%福多寧可濕性粉劑	FRAC-7	白絹病	3,000	14	未訂	
5%三泰隆可濕性粉劑	FRAC 3	白粉病	2,000	3	2.0	豌豆苗採收前6天停止使用。
10.5%平克座乳劑	FRAC 3	白粉病	4,000	6	0.5	
84.2%三得芬乳劑	FARC 5	白粉病	3,500	9	1.0	
50%白克列水分散性粒劑	FRAC 7	白粉病	2,500	9	1.0	禁止用於豆苗。
50%撲滅寧可濕性粉劑	FRAC E3	白粉病	1200	14	2.0	1.兼防白絹病 2.限結莢前使用
24.9%待克利乳劑	FRAC 3	白粉病	3,000	3	1.0	兼防炭疽病、角斑病、豇豆煤黴病
24.9%待克利水懸劑	FRAC 3	白粉病	3,000	3	1.0	同上
250g/L 待克利乳劑	FRAC 3	白粉病	3,000	3	1.0	同上
10% 待克利水分散性粒劑	FRAC 3	白粉病	3,000	3	1.0	同上
99%礦物油乳劑	非農藥資材	白粉病	500	免訂	免訂	
50%枯草桿菌	非農藥資材	白粉病	800	免訂	免訂	1.陰天或傍晚施用。 2.避免與銅劑或抗生素混合使用。
80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	FRAC NC	白粉病	1,000	免訂	免訂	
48%松香酯銅乳劑	FRAC M1	露菌病	1,000	免訂	免訂	
23%亞托敏水懸劑	FRAC 11	露菌病	2,000	14	0.5	可兼防疫病與炭疽病
23.6%百克敏乳劑	FRAC 11	炭疽病	3,000	7	0.5	
325g/L 亞托待克利水懸劑	FRAC 11 FRAC 3	炭疽病	2,000	7	亞托敏 0.5 待克利 1.0	
24.9%待克利乳劑	FRAC 3	炭疽病	3,000	3	1.0	兼防白粉、角斑病、豇豆煤黴病
24.9%待克利水懸劑	FRAC 3	炭疽病	3,000	3	1.0	同上
250g/L 待克利乳劑	FRAC 3	炭疽病	3,000	3	1.0	同上

藥劑名稱	作用機制 代碼	防治病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容許量 (PPM)	同時核准使用於防治 其他病蟲害
10% 待克利水分散性粒劑	FRAC 3	炭疽病	3,000	3	1.0	同上
0.5%開寧激素溶液	植物生長調節 劑	菜豆促進開 花	1,000	未訂	未訂	限菜豆促進開花用、始花期均勻 噴施於全株。