



# 新聞資料

農業部高雄區農業改良場  
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 115013 號

中華民國 115 年 3 月 16 日

## 荔枝小果期將至 蒂頭蟲防治要趁早

高屏地區的玉荷包荔枝即將進入謝花後的小果期，危害果實的蒂頭蟲-荔枝細蛾，在小果期(約綠豆大小時)就會在果皮表面產卵，孵化後的幼蟲隨即進入果實內取食。為確保荔枝的產量與品質，高雄區農業改良場(以下簡稱高雄農改場)提醒農友，小果期為蒂頭蟲重要的防治時機，須趁早防治。

高雄農改場羅正宗場長表示，荔枝小果形成後，就會誘引荔枝細蛾成蟲前來產卵於果實表皮，幼蟲孵化後即直接蛀入果實內部危害。在果肉尚未包裹種子前，幼蟲蛀食種子；當果肉開始生長並包覆種子後，幼蟲則蛀蝕果蒂處，受害果實會提早脫落，部分收成果實蒂部常見細蛾幼蟲及蟲糞，導致果品價值降低，造成損失。

羅場長進一步強調，因果實在綠豆大小時，就會有成蟲來產卵，故防治須趁早，務必在害蟲發生初期防治，避免後續害蟲密度升高，導致防治困難。由於成蟲喜棲息於枝條下方，噴藥時亦應加強樹冠內的枝條噴灑，提升防治成效。可選擇植物保護資訊系統 (<https://otserv2.acri.gov.tw/ppm/>) 或農藥資訊服務網 (<https://pesticide.aphia.gov.tw/information/>) 核准用於防治荔枝細蛾的藥劑，如亞滅培、芬殺松、加保利、益洛寧、第滅寧、賜諾特、賽安勃等，且應選擇作用機制不同的藥劑輪流使用，以避免抗藥性產生。農友在害蟲鑑定或防治上如有進一步問題，歡迎逕洽高雄農改場，技術人員將竭誠為農友服務。

聯絡人：陳明吟 助理研究員

電話：08-7746758



果皮上的荔枝細蛾卵



取食荔枝種子的荔枝細蛾幼蟲