

毛豆病蟲害防治用藥摘要表

高雄區農業改良場 1041104 修訂

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	日本安全容許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物之病蟲害防治
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC-11 FRAC-7	銹病	1,500	9	白克列 1.0 百克敏 0.5	3.0 0.5	禁止施用於豆苗上。 兼防炭疽病、白粉病。
75%嘉保信可濕性粉劑	FRAC-7		1,500	6	5.0	未訂	
50%白克列水分散性粒劑	FRAC-7	白粉病	2,500	9	1.0	3.0	禁止施用於豆苗上。
99%礦物油乳劑	FRAC-NC		500	免訂	免訂	-	兼防粉蝨及葉蟬。
80%碳酸氫鉀水溶性粉劑			1,000	免訂	免訂	-	
84.2%三得芬乳劑	FRAC-5		3,500	9	1.0	0.05	
5%三泰隆可濕性粉劑	FRAC-3		2,000	3	2.0	0.1	
10.5%平克座乳劑	FRAC-3		4,000	6	0.5	0.05	
24.9%待克利乳劑	FRAC-3		3,000	3	1.0	未訂	兼防炭疽病。
24.9%待克利水懸劑	FRAC-3		3,000	3	1.0	未訂	同上。
250g/L 待克利乳劑	FRAC-3		3,000	3	1.0	未訂	同上。
10% 待克利水分散性粒劑	FRAC-3		800	3	1.0	未訂	同上。
50%枯草桿菌可濕性粉劑	FRAC-44	白粉病	800	免訂	免訂		避免與銅劑或抗生素混合使用。
48%松香酯銅乳劑	F-Chem-11	露菌病	1,000	免訂	免訂	免訂	兼防疫病
23%亞托敏水懸劑	FRAC-11		1,000	14	0.5	5.0	兼防疫病、炭疽病及白粉病。
35%滅達樂可濕性粉劑	FRAC-4		3 公克/每 公斤種子	未訂	2.0	0.2	限拌種使用。
23%亞托敏水懸劑	FRAC-11	炭疽病	1,000	14	0.5	5.0	兼防疫病、露菌病及白粉病。
23.6%百克敏乳劑	FRAC-11		3,000	7	0.5	0.5	兼防露菌病
325g/亞托待克利水懸劑	FRAC-11 FRAC-3		2,000	7	亞托敏 0.5 待克利 1.0	5.0 未訂	
24.9%待克利乳劑	FRAC-3		3,000	3	1.0	未訂	兼防白粉病。

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	日本安全容許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物之病蟲害防治
24.9%待克利水懸劑	FRAC-3	炭疽病	3,000	3	1.0	未訂	同上
250g/待克利乳劑	FRAC-3		3,000	3	1.0	未訂	同上
10%待克利水分散性粒劑	FRAC-3		800	3	1.0	未訂	同上
75%四氯異苯腈可濕性粉劑	FRAC-M5		600	6	5.0	2.0	兼防銹病及露菌病
75%四氯異苯腈水分散性粒劑	FRAC-M5		600	6	5.0	2.0	同上
40%四氯異苯腈水懸劑	FRAC-M5		300	6	5.0	2.0	同上
35%依得利可溼性粉劑	FRAC-14	幼苗疫病	3,000	未訂	0.5	0.1	播種當日及 10-15 天後澆灌 1 次。禁用於豆苗及乾豆類。
25%依得利乳劑	FRAC-14		1,500	未訂	0.5	0.1	同上
23%亞托敏水懸劑	FRAC-11	疫病	1,000	14	0.5	5.0	兼防炭疽病、露菌病及白粉病。
15%福多寧乳劑	FRAC-7	白絹病	900	14	未訂	2.0	
20%福多寧水懸劑	FRAC-7		1,200	14	未訂	2.0	
50%福多寧可濕性粉劑	FRAC-7		3,000	14	未訂	2.0	
75%賽滅淨可濕性粉劑	IRAC-17	潛蠅類	5,000	6	1.0	未訂	
8.9%賽滅淨溶液			1,000	7	1.0	未訂	
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC-3A		2,000	3	1.0	1.0	兼防蝶蛾類、葉蝻類、薊馬類、蚜蟲類。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC-3A		2,000	3	1.0	1.0	同上。
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC-3A		2,000	3	1.0	1.0	同上。
10%福瑞松粒劑	IRAC-1B		10kg/公頃	種植前施用	0.05	0.2	1.將藥劑與適量之砂土混拌後均勻施於植溝中，覆土 3 公分後種植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。 3.生長期不可施用
40%賽速安勃水分散性粒劑	IRAC 4A IRAC-28	蝶蛾類	5,000	6	賽速安 0.02 剋安勃 0.5	0.3 1.0	

300 g/l 賽速安勃水懸劑	IRAC 4A IRAC-28	蝶蛾類	4,000	6	賽速安 0.02 剋安勃 0.5	0.3 1.0	
44.9%陶斯松乳劑	IRAC 1B		1,000	16	未訂	0.3	兼防蚜蟲類、薊馬類及粉蝨類。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC-3A		2,000	3	1.0	1.0	兼防潛蠅類、葉蟬類、薊馬類、 蚜蟲類。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC-3A		2,000	3	1.0	1.0	同上。
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC-3A		2,000	3	1.0	1.0	同上。
50%馬拉松乳劑	IRAC-1B		500	4	2.0	2.0	不可與鹼性藥劑混用。 兼防蚜蟲類及介殼蟲類。
22%美氟綜水懸劑	IRAC-22B		1,000	15	1.0	10.0	十字花科蔬菜小菜蛾。
5%因滅汀水溶性粒劑	IRAC-6		3,500	3	0.02	0.1	
2.15%因滅汀乳劑	IRAC-6		1,500	3	0.02	0.1	
14.5%因得克水懸劑	IRAC-22A		2,000	6	0.5	1.0	
43%佈飛松乳劑	IRAC-1B		800	10	1.0	0.05	1.兼防薊馬類及潛蠅類。 2.避免與石灰硫磺劑混合使用。
10%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC-3A		3,000	9	0.5	5.0	
5%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC-3A		1,500	9	0.5	5.0	
5%賽滅寧水基乳劑	IRAC-3A		1,500	9	0.5	5.0	
18.4%剋安勃水懸劑	IRAC-28		2,500	6	0.5	1.0	
35%剋安勃水分散性粒劑	IRAC-28		5,000	6	0.5	1.0	
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC-3A	薊馬類	2,000	3	1.0	1.0	兼防蝶蛾類、葉蟬類、蚜蟲類及 潛蠅類。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC-3A		2,000	3	1.0	1.0	同上。
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC-3A		2,000	3	1.0	1.0	同上。
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC-3A		1,000	3	1.0	0.6	兼防蝶蛾類、粉蝨類、葉蟬類及 蚜蟲類。
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC-3A		1,000	3	1.0	0.6	同上。
9.6%益達胺水懸劑	IRAC-4A		1,500	9	3.0	3.0	兼防蚜蟲類、粉蝨類及薊馬類。

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	日本安全容許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物之病蟲害防治
9.6%益達胺溶液	IRAC-4A	薊馬類	1,500	9	3.0	3.0	同上。
25%福化利乳劑	IRAC-3A		3,000	7	0.5	未訂	兼防蚜蟲類。
43%佈飛松乳劑	IRAC-1B		800	10	1.0	0.05	1.兼防蝶蛾類及潛蠅類。 2.避免與石灰硫磺劑混合使用。
2.9%貝他-賽扶寧乳劑	IRAC-3A		1,500	9	0.5	2.0	兼防蝶蛾類。
20%亞滅培水溶性粉劑	IRAC-4A		4,000	6	1.0	3.0	兼防蚜蟲類及粉蝨類。
2.5%賜諾殺水懸劑	IRAC-5		1,000	3	0.3	0.3	兼防蝶蛾類。
11.6%賜諾殺水懸劑	IRAC-5		4,500	3	0.3	0.3	同上
80%賜諾殺可濕性粉劑	IRAC-5		32,000	3	0.3	0.3	同上
20%達特南水溶性粒劑	IRAC-4A	粉蝨類	3,000	9	0.5	2.0	兼防蚜蟲類、薊馬類及葉蟬類。
28.8%益達胺溶液	IRAC-4A		4,500	21	3.0	3.0	兼防蚜蟲類、薊馬類及葉蟬類。
9.6%益達胺水懸劑	IRAC-4A		1,500	9	3.0	3.0	同上。
9.6%益達胺溶液	IRAC-4A		1,500	9	3.0	3.0	同上。
25%派滅淨可濕性粉劑	IRAC-9B		2,000	21	0.5	未訂	兼防蚜蟲類及葉蟬類。
0.5%可尼丁粒劑	IRAC-4A		60kg/公頃	6	0.1	2.0	播種後 21 天畦上施藥。 兼防蚜蟲類及潛蠅類。
25%賽速安水溶性粒劑	IRAC-4A		2,000	6	0.02	0.3	兼防蚜蟲類及葉蟬類。
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC-3A	蚜蟲類	1,000	3	1.0	0.6	兼防蝶蛾類、粉蝨類、薊馬類及葉蟬類。
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC-3A		1,000	3	1.0	0.6	同上。
20%畢達本可濕性粉劑	IRAC-21A	葉蟬類	2,000	14	0.1	2.0	
5%芬普蟎水懸劑	IRAC-21A		2,000	14	2.0	2.0	
18.5%大克蟎可濕性粉劑	IRAC-un		500	未訂	0.5	3.0	
35%大克蟎可濕性粉劑	IRAC-un		950	未訂	0.5	3.0	
35%芬佈克蟎可濕性粉劑	IRAC-12B IRAC-un	葉蟎類	500	7	芬佈賜未訂 大克蟎 0.5	0.05 3.0	

41%嘉磷塞異丙胺鹽溶液	HRAC G	雜草	80-120	未訂	0.2	0.2	1.不可噴及作物，以免發生藥害。 2.限萌芽前使用，不可噴及作物。
13.5%固殺草溶液	HRAC H	雜草	3L/公頃	未訂	0.2	0.2	1.不可噴及作物，以免發生藥害。 2.限開花前使用。
38.7%施得圃膠囊懸著劑	HRAC K1	雜草	2.5L/公頃	未訂	0.1	0.2	播種覆土後將藥劑均勻噴施於土壤表面，施藥時田間應保持濕潤狀態。
13.2%剋草同乳劑	HRAC A	禾本科 雜草	0.8L/公頃	未訂	0.2	6.0	1.僅對禾本科雜草有效。 2.限開花前使用。
5.3%得殺草乳劑	HRAC A	禾本科 雜草	1L/公頃	未訂	1.0	1.0	1.僅對禾本科雜草有效。 2.限開花前使用
12.5%西殺草乳劑	HRAC A	禾本科 雜草	2L/公頃	未訂	10.0	10.0	禾本科雜草 3-5 葉時噴施於雜草上。