

大豆病蟲害防治用藥摘要表

高雄區農業改良場 1041104 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	安全容許量 (PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物 之病蟲害防治
23%亞托敏水懸劑	FRAC-11	疫病	2,000	14	0.5	兼防炭疽病、露菌病及白粉病。
50%撲滅寧可濕性粉劑	FRAC-2	白絹病	2,000	限種植時施用	未訂	定植後每株灌注 200 毫升，15 天 後再灌注一次。
15%福多寧乳劑	FRAC-7	白絹病	900	21	0.5	
20%福多寧水懸劑	FRAC-7	白絹病	1,200	21	0.5	
50%福多寧可濕性粉劑	FRAC-7	白絹病	3,000	21	0.5	
80%錳乃浦可濕性粉劑	FRAC-M3	紫斑病	400	15	0.5	兼防炭疽病
75%嘉保信可濕性粉劑	FRAC-7	銹病	1,500	14	0.5	
80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	FRAC-M3	銹病	400	未訂	0.5	1.兼防炭疽病 2.花蕾萌出時施用
18%賽福寧乳劑	FRAC-3	銹病	750	未訂	0.5	兼防白粉病
5%三泰芬可濕性粉劑	FRAC 3	銹病	600	20	0.1	1.兼防白粉病 2.播種 20-30 天使用
99%礦物油乳劑	FRAC-NC	白粉病	500	免訂	免訂	兼防粉蝨及葉蟬
80%碳酸氫鉀水溶性粉劑		白粉病	1,000	免訂	免訂	
84.2%三得芬乳劑	FRAC-5	白粉病	3,500	9	0.5	
5%菲克利水懸劑	FRAC 3	白粉病	2,000	7	0.2	兼防銹病
50%枯草桿菌可濕性粉劑	FRAC-44	白粉病	800	免訂	免訂	避免與銅劑或抗生素混合使用
48%松香酯銅乳劑		露菌病	1,000	免訂	免訂	兼防疫病
23%亞托敏水懸劑	FRAC-11	露菌病	2,000	14	0.5	兼防疫病、炭疽病及白粉病。
75%四氯異苯腈可濕性粉劑	FRAC-M5	炭疽病	600	7	0.1	兼防銹病及露菌病
75%四氯異苯腈水分散性粒 劑	FRAC-M5	炭疽病	600	7	0.1	同上

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	安全容許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物之病蟲害防治
40%四氯異苯腈水懸劑	FRAC-M5	炭疽病	300	7	0.1	同上
47.5%鋅錳乃浦水分散性油懸劑	FRAC-M3	炭疽病	600	3	0.5	兼防紫斑病及銹病
33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC-M3	炭疽病	400	3	0.5	同上
80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	FRAC-M3	炭疽病	1,000	3	0.5	同上
27.3%三氟得克利水懸劑	FRAC-11 FRAC 3	炭疽病	2,500	7	三氟敏 0.05 得克利 0.5	
560g/L(56%w/v)四氯托敏水懸劑	FRAC-M5 FRAC-11	炭疽病	1,000	7	四氯異苯腈 0.1 亞托敏 0.5	兼防露菌病
8.9%賽滅淨溶液	IRAC-17	潛蠅類	1,000	9	0.5	
10%福瑞松粒劑	IRAC-1B	潛蠅類	10kg/公頃	限種植前施用	0.05	1.兼防蚜蟲類及葉蟬類。 2.藥劑均勻施於植溝，覆土後播種，土壤保持濕度易發揮藥效。
10%托福松粒劑	IRAC-1B	潛蠅類	20kg/公頃	限種植前施用	0.01	1.兼防切根蟲。 2.藥劑均勻施於植溝，覆土後播種，土壤保持濕度易發揮藥效。
3%加保扶粒劑	IRAC-1A	潛蠅類	40kg/公頃	限種植前施用	0.5	1.兼防蚜蟲類及地下害蟲。 2.藥劑與肥料混合施於大豆播種溝，覆土 1-3 公分後再播種。
0.5%芬化利粒劑	IRAC-3A	切根蟲	50kg/公頃	限種植時施用	0.1	種植前 3 天及定植後 3 天、10 天各在畦上施藥 一次，每次施藥後以鐵耙拌土約 5 公分。
5%因滅汀水溶性粒劑	IRAC-6	蝶蛾類	3,500	3	0.02	
2.15%因滅汀乳劑	IRAC-6	蝶蛾類	1,500	3	0.02	
10%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC-3A	蝶蛾類	3,000	30	0.05	兼防薊馬類
5%賽滅寧水基乳劑	IRAC-3A	蝶蛾類	1,500	30	0.05	同上
43%佈飛松乳劑	IRAC-1B	蝶蛾類	800	10	0.05	1.兼防薊馬類及潛蠅類。 2.避免與石灰硫磺混合使用。

24%納乃得溶液	IRAC-1A	蝶蛾類	500	35	0.5	兼防蚜蟲類、薊馬類及椿象類。
40%納乃得水溶性粒劑	IRAC-1A	蝶蛾類	900	未訂	0.5	同上
5%克福隆乳劑	IRAC-15	蝶蛾類	2,000	15	0.2	兼防葉蟬類
50%撲滅松乳劑	IRAC-1B	蝶蛾類	1,000	14	0.05	兼防薊馬類及椿象類。
50%撲馬松乳劑	IRAC-1B	蝶蛾類	1,000	14	撲滅松 0.05 馬拉松 0.5	兼防薊馬類及椿象類。
50%加保利可濕性粉劑	IRAC-1A	蝶蛾類	500	14	0.5	兼防葉蟬類及椿象類。
85%加保利可濕性粉劑	IRAC-1A	蝶蛾類	850	未訂	0.5	
22.6%滅芬諾水懸劑	IRAC-18	蝶蛾類	2,000	21	1.0	
70%得芬諾可濕性粉劑	IRAC-18	蝶蛾類	3,000	7	0.1	
19.7%得芬諾水懸劑	IRAC-18	蝶蛾類	2,000	7	0.1	
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC-5	蝶蛾類	3,000	9	0.05	兼防薊馬類
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC-3A	蝶蛾類	1,000	7	0.5	兼防粉蝨類、葉蟬類及蚜蟲類。
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC-3A	蝶蛾類	1,000	7	0.5	同上。
18.4%剋安勃水懸劑	IRAC-28	蝶蛾類	2,500	21	0.2	
35%剋安勃水分散性粒劑	IRAC-28	蝶蛾類	5,000	21	0.2	
43%佈飛松乳劑	IRAC-1B	薊馬類	800	10	0.05	1.兼防蝶蛾類及潛蠅類。 2.避免與石灰硫磺混合使用。
2.5%賜諾殺水懸劑	IRAC 5	薊馬類	1,000	28	0.02	兼防蝶蛾類。 對蜜蜂毒性高。
11.6%賜諾殺水懸劑	IRAC-5	薊馬類	4,500	28	0.02	同上
80%賜諾殺可濕性粉劑	IRAC-5	薊馬類	32,000	28	0.02	同上
10%福瑞松粒劑	IRAC-1B	蚜蟲類	10kg/公頃	限種植前施用	0.05	1.兼防潛蠅類及葉蟬類。 2.藥劑均勻施於植溝，覆土後播種，土壤保持濕度易發揮藥效。
18.5%大克蟎可濕性粉劑	IRAC-un	葉蟎類	500	7	0.1	
35%大克蟎可濕性粉劑	IRAC-un	葉蟎類	950	7	0.1	

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	安全容許量 (PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物 之病蟲害防治
35%芬佈克蟎可濕性粉劑	IRAC-12B IRAC-un	葉蟎類	500	7	芬佈賜 1.0 大克蟎 0.1	
10%福瑞松粒劑	IRAC-1B	葉蟎類	10kg/公頃	限種植前施用	0.05	1.兼防蚜蟲類及潛蠅類。 2.藥劑均勻施於植溝，覆土後播種，土壤保持濕度易發揮藥效。
25%新殺蟎乳劑	IRAC-un	細蟎類	500	30	0.1	