

高屏地區甜椒之栽培特性

◆韓青梅◆

甜椒屬於茄科，原產中南美洲，後經歐洲、印度，於明朝末年傳入我國，本省於光復後才普遍栽培。甜椒含有豐富的維他命C及葉綠素，可炒食、油煎、生食之用，近年來，國人有愈來愈喜愛生菜沙拉之趨勢。

據臺灣農業年報統計，高屏地區甜椒栽培面積佔全省30%，僅次於雲林縣，為高屏地區重要果菜類之一，現將其適宜之氣候土壤、目前栽培品種及栽培特性介紹如下：

氣候土宜

甜椒性喜溫暖乾燥氣候，種子發芽適溫為25~30℃，植株生育適溫為25℃左右，溫度低於15℃及高於32℃則結果不良。對日照之長短並不敏感，根部不發達，屬於淺根性作物，故土壤應選擇土層深厚、灌排水良好之砂質壤土較佳，pH5.5~6.8最宜。

栽培品種

高屏地區農民目前栽培的品種大部份為雜交一代品種，主要有以下數種：



女王星：耐毒素病，成熟期約100天，中晚生，植株粗壯直立，平均果長16公分，果寬6.3公分，果重210公克，適於生食。

太陽星：中早生，成熟期約92天，平均果長16公分，果寬6公分，果重190公克。

天王星：中早生，成熟期約92天，極耐煙草炭紋病毒(TMV)，果長15公分，果寬7公分，果重250公克，果色光豔，品質甜脆。

銘星：中早生，成熟期90天，平均果長16公分，果寬6公分，果重190公克，耐低溫及耐煙草炭紋病毒和馬鈴薯病毒。

新宇：中生，植株高度中等，平均果長18公分，果寬7公分，耐熱性佳，適合夏季高海拔栽培。

青宇：中早生，成熟期約90天，平均果長13公分，果寬8公分，果重260公克，適合秋冬季栽培。

和星：早生，耐煙草炭紋病毒，果實羊角形、微辣，果長16公分，果寬3.7公分，為目前市場最新流行果型。



栽培特性


播種：高屏地區播種適期，春作 1～3 月，秋作8～9月，尤其秋播不宜太晚，否則定植後氣溫逐漸降低，植株生育遲緩，延遲採收期，縮短採收期間，進而影響產量。

育苗：目前農家皆採用移植栽培，育苗場一般以128穴盤育苗，育苗期約6～8週。

整地及施肥：每10公畝施用堆肥1000～2000公斤（亦可用豆餅100～150公公斤），作為基肥，然後整地，作高畦，畦為南北走向以防止高溫引起之日燒病，畦寬130公分，雙行植，株距 45公分。三要素用量是定植後至第一次採收，氮肥12～15公斤，磷鉀12～15公斤，氯化鉀15～18公斤，每次果實採收後再施用氮肥3～5公斤，但肥料用量仍應依栽培田之土壤肥力而決定。

覆塑膠布栽培：鋪銀灰色塑膠布栽培可防止雜草，對蚜虫有忌避作用，減低毒素病之發生，若在雨季或低溫期使用，則效果更佳。

中耕除草：於植株定植後30日內行中耕除草，生育後期中耕除草應儘量少傷及根群。除草可利用殺草劑，其使用方法為每10公畝施用 300毫升34%施得圃乳劑，稀釋250倍於定植前均勻噴於土面。須特別注意者其為萌前殺草劑，一定要在雜草萌芽前施藥，且施藥時須保持土面呈濕潤狀態。



和星品種

立支柱：甜椒存活後，以60公分長之竹竿立支柱，以防止倒伏，亦可用 5 孔之110 公分寬網子，距地面25～30公分處水平掛展，以防植株倒伏。在第一分叉以下之主幹上之葉腋所產生之傍芽，應儘早摘除。

灌溉：甜椒為一既不耐旱又不耐濕之作物，生育期中太濕，易引起根部腐爛，枯死，葉片枯黃脫落，故於雨後應注意排水。結果期則應儘量避免乾旱，水分失調，以免引起落花、落果及小果之形成。

收穫：當果實充分長大，而尚未老化時即為採收適期，如採收不當，不但收量減少，且果實易萎軟，不耐貯運。又因甜椒枝條脆弱易斷，故採收時應多加注意。 



甜椒毒素病株