



# 新聞資料

農業部高雄區農業改良場  
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 115010 號

中華民國 115 年 2 月 24 日

## 關注安全用藥 守護鳳梨收成

每年 2 至 6 月是鳳梨結果與採收的重要時期，也是影響產量與品質的關鍵階段。果實發育期間若管理不當，容易遭遇粉介殼蟲、紋翅蛾及黑腐病等病蟲害危害，不僅影響外觀與品質，嚴重時更可能影響銷售與收益。農業部高雄區農業改良場籲請農友密切留意田間狀況，適時進行防治，落實安全用藥原則，守護農產品產量及安全。

高雄場場長羅正宗表示，粉介殼蟲喜歡聚集於果實基部，吸食植株汁液，隨著果實成熟度增加，族群密度也隨著升高，引發嚴重的煤煙病，使果皮褐化果品賣相不佳。紋翅蛾幼蟲則喜歡躲藏於果目內或果實表面縫隙中取食乾枯花器，雖對果肉不造成影響，但因被輸入國要求果品進行燻蒸處理，增加輸出成本且影響櫥架壽命。高溫多濕及果實傷口都是引起黑腐病的重要因素，病原菌的孢子可自傷口發芽侵入，並於果肉細胞間及細胞內蔓延，導致果實腐爛，降低商品價值。

為降低病蟲害發生風險，高雄場提醒農民朋友加強田間巡查，並配合氣候環境，於病蟲害發生初期進行防治。在用藥方面，務必選用核准登記於鳳梨的防治藥劑，並依標示建議用量施用，切勿自行加重劑量或混合不明藥劑，以免造成藥害或農藥殘留問題。如果是外銷果品，用藥應選擇輸入國核可於鳳梨的藥劑，並遵守安全採收期，以符合輸出條件。因黑腐病好發於高濕環境，容易從傷口侵入，田間管理時，應適時用肥以避免果實裂目，下雨天應避免採收果實，且採收、包裝、運輸也須留意，減少碰撞以避免產生傷口。把關用藥安全，不僅守護鳳梨品質與消費者健康，更是確保農民辛苦成果的重要關鍵。農友在鑑定或防治上如有進一步問題，歡迎逕洽高雄場（陳明吟

助理研究員，電話：08-7746758)，技術人員將竭誠為農友服務。

聯絡人：陳明吟 助理研究員

電話：08-7746758



鳳梨果目上布滿粉介殼蟲



紋翅蛾幼蟲喜躲藏於果目內



傷口及高濕容易導致黑腐病發生



守護鳳梨收成 安全用藥蓋重要