

鳳梨病蟲害防治用藥摘要表

高雄區農業改良場 1040207 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容 許量(PPM)	日本安全容 許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
50%蓋普丹可濕性粉劑	FRAC M4	心腐病	300~400	未訂	1.0	5.0	
80%福賽得可濕性粉劑	FRAC 33,	心腐病	200	未訂	20.0	80.0	1.浸苗處理。
80%福賽得水分散粒劑	FRAC 33,	心腐病	200	未訂	20.0	80.0	2.種植後 20 天，將藥液噴射或灌注植株心部。
700 cpu/g 純白鏈黴菌素水溶性 粉劑	Category-F	心腐病	8,00	免訂	免訂	免訂	
10%普伏松粒劑	IRAC 1B	根瘤線蟲	70 公斤/ 公頃	未訂	0.02	未訂*	植溝處理 (土壤保持適當濕度)
56%大利松水基乳劑	IRAC 1B	粉介殼蟲	1,500	未訂	1.0	0.1*	
60%大利松乳劑	IRAC 1B	粉介殼蟲	1,500	未訂	1.0	0.1*	
20%撲滅松乳劑	IRAC 1B	粉介殼蟲	1,000	未訂	0.5	0.05*	
50%撲滅松乳劑	IRAC-1B	粉介殼蟲	2,500	9	0.5	0.05*	
50%芬殼松乳劑	IRAC 1B	粉介殼蟲	1,000	9	1.0	未訂*	
40.8%陶斯松乳劑	IRAC 1B	粉介殼蟲	2,000	未訂	0.5	0.05*	
40.8%陶斯松水基乳劑	IRAC 1B	粉介殼蟲	2,000	未訂	0.5	0.05*	
10%福瑞松粒劑	IRAC 1B	粉介殼蟲	0.5 公克/株	未訂	0.05	0.05	
3%加保扶粒劑	IRAC 1A	粉介殼蟲	60 公斤/ 公頃	未訂	0.5	0.3*	果實形成後停止施藥。
20%達特南水溶性粒劑	IRAC 4A	粉介殼蟲	2,000	10	1.0	未訂*	
100g/L 賦派滅水懸劑	IRAC 23	粉介殼蟲	1,500	10	0.1	未訂*	
40%達有龍溶液	HRAC C2	雜草	150~200		0.2	0.8	1.萌前處理，故對成株及 宿根雜草無效。
80%達有龍水溶性粒劑	HRAC C2	雜草	400~500		0.2	0.8	2.避免噴及鳳梨植株葉片 及心部。

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容 許量(PPM)	日本安全容 許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
41%嘉磷塞異丙胺鹽溶液	HRAC G	雜草	150~200		0.2	0.1*	避免噴及鳳梨植株
17.5%伏寄普乳劑	HRAC G	雜草	400		0.2	0.05*	
80%克草可濕性粉劑	HRAC C1	雜草	300		0.5	0.07*	萌前處理
80%草脫淨可濕性粉劑	HRAC C1	雜草	200~500		0.25	0.02*	
39.5%益收生長素溶液		催熟用	25ml/棵		2.0	2.0	成熟前使用
98%荼乙酸鈉水溶性粉劑		生長調節	10,000			未訂*	
15%艾維激素水溶性粉劑		抽穗抑制	1500		0.08	未訂*	

備註：1. 輪替使用不同作用機制藥劑。

2. *：欲生產輸日鳳梨者盡量避免使用。