



新聞資料

行政院農業委員會高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 108021 號

中華民國 108 年 4 月 29 日

雨季來臨前及早防範作物病害

時序即將進入梅雨季節，也即將進入我國許多熱帶作物盛產的季節。在多雨季節中，作物病蟲害發生風險亦隨之提高。行政院農業委員會高雄區農業改良場(以下簡稱高雄場)籲請轄區農友適時進行病蟲害預防工作，清除田間殘枝落果，降低病原菌感染源，及早防範雨季可能造成的農作物損失。

高雄場戴順發場長說明，夏日季節正是我國木瓜、番石榴、荔枝、紅龍果、瓜果及豆菜等作物生產的時節。梅雨可能帶來的雨水易提高作物磨擦的機會而增加作物表皮傷口，使得作物受病原菌侵染機率提高。特別是盛產於夏日的木瓜，遇到高溫多雨時易受疫病、根腐病等病害侵染。而雨水對於病原菌的沖刷、飛濺，也加速炭疽病等病害的傳播速度，使得木瓜、番石榴、荔枝等作物在多雨時節更易發生炭疽病。另外，荔枝露疫病、酸腐病在雨季也是不可輕忽的病害。戴場長籲請農友把握雨季來臨前的時機，盡早清理田間殘枝落果，減少病原菌密度；適時進行施用預防性防治資材，以提早防範雨季可能造成的傷害。

雨季時，木瓜、荔枝、瓜果、豆菜類等作物容易發生疫病(俗稱水傷)。可以在雨季來臨前施用亞磷酸(以氫氧化鉀中和後稀釋1,000倍)，每周1次，施用3~4次，可誘導作物抗病性；或在雨季前施用廣效性的27.12%三元硫酸銅水懸劑並配合清園及田間衛生管理工作，防範各類真菌及細菌性病害蔓延。此外，梅雨期間也是柑桔潰瘍病；番石榴炭疽病、黑星病、瘡痂病、疫病；木瓜根腐病、疫病；芒果炭疽病、荔枝露疫病及紅龍果潰瘍病等病害好發時節，落實田間衛生管理是首要工作，各項保護藥劑可參考使用植物保護手冊上的推薦藥劑(<https://www.tactri.gov.tw/>)或到該場網站植物保護資訊項下作物安全用藥資訊中查詢(<https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=5>)。若有任何作物相關技術問題，可逕洽高雄場，技術人員將竭誠為農友服務。

聯絡人：曾敏南

電話：08-7389158 轉 755



荔枝果實罹患酸腐病，出現褐色水浸狀之病斑並造成裂果。



木瓜植株受雨水浸泡後易發生根腐



雨季時，番石榴好發炭疽病。



降雨容易加速紅龍果潰瘍病的傳播