



新聞資料

行政院農業委員會高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 108027 號

中華民國 108 年 6 月 10 日

梅雨鋒面將到，高雄場籲請農友加強作物防範措施

根據中央氣象局預報，本週二～四因鋒面接近及西南氣流的影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，各地區甚至有大雨至豪雨等級以上的雨量，高雄區農業改良場(以下簡稱高雄場)籲請農友適時採收已近成熟之農作物，加強田區排水，清除田間殘枝落果，降低病原菌感染源，及早防範以減輕豪大雨對農作物的損失。

高雄場戴順發場長表示，劇烈降雨或連續豪雨常造成田間浸水，導致病害蔓延或根系缺氧，嚴重時會使植株根系腐爛而死亡；高屏地區部分果園若有排水不良區域，施肥後遇強降雨，也常見造成植株鹽害而發生落葉的情形，嚴重時植株弱化，生產力降低。建議農友檢視園區排水溝，清理園區殘枝、落果，確保排水順暢。若需施用化學肥料，宜分次減量施用，避免強降雨後肥料流失，或蓄積於果園較低窪處造成鹽害，尤其屏南沿海鄉鎮蓮霧園多為排水不易的黏質土，雨季施肥應特別謹慎，必要時建議改以葉面施肥補充。

高雄場戴場長進一步指出，目前仍是高屏地區蔬果盛產期，提醒農友隨時注意天氣及田間作物變化，並預防病害發生。適收期的果菜類、葉菜類蔬菜及果樹(如芒果、木瓜、紅龍果等)，應儘快採收。尤其木瓜為連續採收作物，若遇連續降雨常造成果實早熟而糖度降低等情形，此時需提前疏果減輕植株負擔，並控制適當葉/果比，以利樹勢及果實品質的維持；紅龍果雨季果實易在貯後出現濕腐病，連續降雨前可噴施62.5%賽普護汰寧粒劑2,000倍預防，花謝後應清除花瓣，以降低發病率。正值產期的瓜果、豆菜類容易發生疫病(俗稱水傷)或細菌性軟腐病，在風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀的1,000倍水溶液，以誘發作物產生抗病性，達預防疫病效果。另外，可以在風雨前後施用廣效性的27.12%三元硫酸銅水懸劑，配合清園及田間衛生管理，預防各類真菌及細菌性病害蔓延。各項作物保護藥劑可參考植物保護手冊上的推薦藥劑(<https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/>)或到該場網站植物保護資訊項下作物安全用藥資訊中查詢(<https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665>)。

豪雨前的預防措施，是降低農作物災損的當務之急，若有任何作物相關技術問題，可逕洽高雄區農業改良場，技術人員將竭誠為農友服務。

聯絡人：李雪如、陳思如、朱堉君、周浩平、黃祥益

電話：08-7389158 轉 741、743、742、757 07-6622274 轉 101



正是產季水果，適收期採收避免損失



紅龍果謝花後花瓣離層產生後即可摘除，避免病菌入侵



清除落果及病果，落實田間衛生管理工作，降低病原菌感染源



檢查排水溝，將雜草及垃圾清除避免堵塞

