



新聞資料

行政院農業委員會高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 108040 號

中華民國 108 年 8 月 22 日

白鹿颱風直撲臺灣機率高 高雄場籲請農友加強防範

根據中央氣象局天氣警特報，編號第 11 號颱風白鹿目前位於太平洋海面，預測路徑直撲臺灣機率高，暴風圈可能於本週六對臺灣陸地產生衝擊。目前白鹿颱風為輕度颱風，由於移動速度快，強度增強的幅度應有限，影響臺灣時間也不長，但仍需注意颱風帶來的強風及降雨。高雄區農業改良場(以下簡稱高雄場)籲請農友密切注意氣象局最新預報資訊，做好防災準備，加強作物植株及設施固定，並確保田間排水通暢，以降低強風及降雨可能帶來的損害；同時應注意風雨前後的作物病害防治，以免影響植株健康及作物收成。

高雄場戴順發場長提醒農友，颱風常造成農作物倒伏或折損，造成作物葉片、花及果實損傷，及田區浸水等情況，需於風雨來襲前做好防範措施，以降低損失。如香蕉等易倒伏作物，應加強立支柱固定；忌淹水的木瓜及鳳梨田區，應檢查園區排水溝是否需要重新挖深，以確保排水順暢，避免造成植株衰亡或腐爛；覆蓋黑網進入催花期之蓮霧果園，應隨時注意颱風動態，若果園所在位置即將受強風影響，須預先撤下黑網，待天氣回穩後再重新覆蓋；棗及木瓜簡易網室應加強固定，防範植株及設施設備的損壞；果園如有架設防風網，應確實綁縛穩固。果樹園區於強降雨前或果園浸水後應避免於土表灑施肥料，以免加重衰弱根系的負擔，若有補充肥料需要，宜暫時先以葉面施肥方式補充。蔬菜園除了應加強田區排水溝渠的疏通外，已達採收成熟度的各類蔬菜作物應儘快採收，減少災害的損失。水稻方面，目前高屏地區多屆曬田期，須維持排水系統暢通，避免積水情形。花卉方面，應加強設施維護及露地栽培排水。

颱風過後易造成作物傷口，增加病原菌侵染機率。紅龍果果實雨後易出現濕腐病，謝花後應清除花瓣，以降低發病率。此外，柑桔潰瘍病；番石榴炭疽病、黑星病、瘡痂病、疫病；木瓜根腐病、疫病等，也需加以防範。瓜果、豆菜類蔬果雨後易發生疫病(俗稱水傷)或細菌性病害，可以在風雨前、後施用廣效性的 27.12% 三元硫酸銅水懸劑，配合清園及田間衛生管理工作，預防各類真菌及細菌性病害蔓延。水稻颱風後易發生白葉枯病，應加強防治工作。有關各項作物保護藥劑可參考使用植物保護手冊上的推薦藥劑，或到高雄場網站植物保護資訊項下，查詢高屏地區主要作物的安全用藥資訊。特別要注意用藥安全，依規範使用核准藥劑，並遵照施用濃度、方法及安全採收期。

做好颱風前的預防措施，可有效降低農作物災損，高雄場已成立各項作物技術服務團，提供專業技術諮詢服務，農友若有任何預防措施及災後復耕等相關技術問題，

可逕洽高雄場，技術人員將竭誠為您服務。

相關網路資源：

- 植物保護手冊 <https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm>
- 高雄場作物安全用藥資訊 <https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665>
- 高雄場技術服務團
https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=8959
- 作物防災及復育措施
https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=7415

聯絡人：陳思如、胡智傑、周浩平助理研究員、黃祥益副研究員

電話：08-7389158 轉 743、734、757 07-6622274 轉 101



蓮霧園催花期覆蓋黑網的植株，颱風來臨前應卸下黑網，天氣回穩後再重新覆蓋，以免造成枝葉嚴重損傷，降低催花率。



果園如有架設防風網，應確實綁縛穩固。



颱風豪雨期間及過後需特別注意田間排水工作，避免積水。



水稻颱風後易發生白葉枯病，應加強防治工作。



風雨過後各類病害易蔓延，苦瓜易同時遭受真菌及細菌病害危害。