

## 薑秋行軍蟲緊急防治藥劑及其使用方法與範圍

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋 倍數	施藥時期及方法	注意事項
100 G/L (10% W/V)諾 伐隆 DC (novaluron)	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施 藥，每隔7天施藥一 次。	採收前 21 天停止施 藥。
18.4% 剋安勃 SC (chlorantraniliprole)	0.4-0.5公 升	2,500	害蟲發生時開始施 藥，每隔7天施藥一 次。	採收前 14 天停止施 藥。
5% 護賽寧 SL (flucythrinate)	1公升	800	害蟲發生時開始施 藥，每隔7-10天施藥 一次。	採收前 21 天停止施 藥。
10% 依芬寧 EC (etofenprox)	1.2-1.6公 升	750	害蟲發生時開始施 藥，每隔7天施藥一 次。	採收前 14 天停止施 藥。
20% 依芬寧 WP (etofenprox)	0.6-0.8公 斤	1,500	害蟲發生時開始施 藥，每隔7天施藥一 次。	採收前 14 天停止施 藥。
48.1% 蘇力菌 WG	0.8-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施 藥，每隔7天施藥一 次。	
54% 鮎澤蘇力菌 NB- 200 WG	0.8-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施 藥，每隔7天施藥一 次。	