



新聞資料

行政院農業委員會高雄區農業改良場

屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 109030 號

中華民國 109 年 8 月 10 日

第 6 號颱風逼近 高雄場籲請農友加強防範

根據中央氣象局最新氣象資料警報，編號第 6 號颱風在鵝鑾鼻西南方海面向北移動，由於颱風及外圍環流的影響，今明(10、11 日)兩日恐有強風及豐沛的雨量。高雄區農業改良場(以下簡稱高雄場)籲請農友密切注意氣象局最新預報資訊，適期及時採收已近成熟之農作物，並請做好防災準備工作，加強植株及設施固定，尤其是必需徹底清理田間排水孔，確保排水通暢，以降低強風及降雨可能帶來的損害。

高雄場戴順發場長提醒農友，颱風及瞬間強降雨等劇烈天氣，容易造成農作物倒伏、折損，葉片、花與果實損傷及掉落，因此風雨來襲前須做好防範措施，以減少損失。高屏地區低窪果園需防範田區浸水，並清理園區殘枝、落果，忌淹水的木瓜及鳳梨田區，應檢查園區排水溝是否需要重新挖深，以確保排水順暢，避免造成植株衰亡或腐爛。已覆蓋黑網進入催花期的蓮霧果園，應避免長期浸水造成根系衰弱，並隨時注意颱風動態，若果園所在位置即將受強風影響，應先撤下黑網，待天氣回穩後重新覆蓋；棗及木瓜簡易網室應加強固定，防範植株及設施設備損壞。果樹園區於強降雨前或果園浸水後應避免於土表灑施肥料，以免加重衰弱根系的負擔，嚴重時可能造成植株黃葉死亡，若有補充肥料的需要，宜暫時先以葉面施肥方式補充。蔬菜園除了應加強田區排水溝渠的疏通，已達採收成熟度的各類蔬菜作物應儘快採收，減少災害損失。水稻方面，目前高屏地區多屆分蘗盛期，應維持排水系統暢通，避免積水情形。花卉方面，加強設施維護及露地栽培排水。

強風豪雨過後易造成作物傷口，增加病原菌侵染機率。紅龍果果實雨後易出現濕腐病，謝花後應清除花瓣，以降低發病率。此外，柑桔潰瘍病；番石榴炭疽病、黑星病、瘡痂病、疫病；木瓜根腐病、疫病等，也需加以防範。瓜果、豆菜類蔬果雨後易發生疫病(俗稱水傷)或細菌性病害，可以在風雨前後施用廣效性的 27.12% 三元硫酸銅水懸劑，配合清園及田間衛生管理工作，預防各類真菌及細菌性病害蔓延。水稻颱風後易發生白葉枯病，應加強防治工作。有關各項作物保護藥劑可參考使用植物保護手冊上的推薦藥劑，或到高雄場網站植物保護資訊項下，查詢高屏地區主要作物的安全用藥資訊。特別要注意用藥安全，依規範使用核准藥劑，並遵照施用濃度、方法及安全採收期。

做好風雨前的預防措施，可有效降低農作物災損，高雄場已成立各項作物

技術服務團，提供專業技術諮詢服務，農友若有任何預防措施及災後復耕等相關技術問題，可逕洽高雄場，技術人員將竭誠為您服務。

相關網路資源：

- 植物保護手冊 <https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm>
- 高雄場作物安全用藥資訊 <https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665>
- 高雄場技術服務團
https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=8959
- 作物防災及復育措施
https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=7415

聯絡人：陳思如、李雪如、胡智傑、周浩平、黃祥益

電話：08-7389158 轉 743、741、734、757 07-6622274 轉 101



蓮霧園催花期覆蓋黑網的植株，颱風來臨前應卸下黑網，天氣回穩後再重新覆蓋。



確認果園排水溝通暢，必要時重新掘深。



紅龍果雨後易發生濕腐病，謝花後應摘除花瓣，雨後施用藥劑防治應注意安全採收期。



風雨過後番茄受細菌性斑點病危害嚴重