

番石榴病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢局公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1100615 修訂

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	安全容許量 (PPM)	備註
39.5%扶吉胺水懸劑	FRAC 29	炭疽病	2,000	6	0.5	
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11, C3	炭疽病	2,000	21	1.0	
25.9%得克利水基乳劑⑤	FRAC 3, G1	炭疽病	1,500	6	2.0	施藥至套袋前為止
23.7%依普同水懸劑	FRAC 2, E3	炭疽病	800	12	5.0	
70%甲基多保淨可濕性粉劑⑤	FRAC 1, B1	炭疽病	1,000	6	2.0	
16%腈硫克敏水分散性粒劑⑤	FRAC M9 FRAC 11, C3	炭疽病	1,500	12	腈硫醜 0.2 百克敏 1.0	
23.6%百克敏乳劑	FRAC 11, C3	炭疽病	3,000	12	1.0	開花初期施藥，施藥至套袋前為止
40%克熱淨（烷苯磺酸鹽）可濕性粉劑	FRAC M7	炭疽病	1,500	21	0.5	
80%免得爛水分散性粒劑	FRAC M3	炭疽病	500	14	1.0	
50%三氟敏水分散性粒劑	FRAC 11, C3	炭疽病	4,000	18	1.0	開花初期施藥。施藥至套袋前為止
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑⑤	FRAC 9, D1 FRAC 12, E2	炭疽病	2,000	12	賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	開花初期施藥。施藥至套袋前為止
50%克收欣水分散性粒劑⑤	FRAC 11, C3	炭疽病	2,000	6	2.0	
53%腐絕快得寧可濕性粉劑⑤	FRAC 1, B1 FRAC M1	炭疽病	1,200	6	腐絕 5.0 快得寧 2.0	
42.2%腈硫醜水懸劑	FRAC M9	炭疽病	1,200	9	0.2	
80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	400	30	5.0	

33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3	炭疽病	600	15	5.0	
80%錳乃浦可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	400	30	5.0	
65%得恩地可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	600	15	二硫代 5.0	
80%得恩地可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	800	15	二硫代 5.0	
500g/L 三氟派瑞水懸劑	FRAC 11 FRAC 7	炭疽病	4,000	7	三氟敏 1.0 氟派瑞 2.0	
40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	FRAC M7	瘡痂病	1,500	6	0.5	
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑 ⑤	FRAC 9, D1 FRAC 12, E2	黑星病	1,500	12	賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	著果後施藥。均勻噴佈全株， 施藥至套袋止，最多5次。
50%克收欣水分散性粒劑⑤	FRAC 11, C3	黑星病	2,000	6	2.0	
80%福賽快得寧可濕性粉劑⑤	FRAC 33 FRAC M1	疫病	1,200	6	福賽得 20 快得寧 2.0	
9.4%賽座滅水懸劑	FRAC 21, C4	疫病	3,000	9	2.0	
18.7%達滅克敏水分散性粒劑	FRAC 40, F5 FRAC 11, C3	疫病	1,000	15	達滅芬 1.0 百克敏 1.0	
52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	FRAC 11, C3 FRAC 27	疫病	1,500	12	凡殺同 2.0 克絕 1.0	
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	疫病	800	6	免訂	
60.8%氟比拔克水懸劑⑤	FRAC 43, B5 FRAC 28, F4	疫病	1,000	30	氟比來 未訂 普拔克 未訂	
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	粉介殼蟲	3,000	6	0.5	
75%陶斯松水分散性粒劑	IRAC 1B	粉介殼蟲	3,000	12	1.0	
50%陶斯松可濕性粉劑	IRAC 1B	粉介殼蟲	2,500	6	1.0	
11%百利普芬乳劑	IRAC 7C	粉介殼蟲	1,500	12	0.5	
11%百利普芬水基乳劑	IRAC 7C	粉介殼蟲	1,500	12	0.5	

40%滅大松可濕性粉劑水溶性袋裝	IRAC 1B	粉介殼蟲	1,000	12	0.1	
24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑 ^⑤	IRAC 4A IRAC 3A	粉介殼蟲	2,000	6	賽速安 0.5 賽洛寧 1.0	
21.8%速殺氟水懸劑	IRAC 4C	粉介殼蟲	3,000	7	2.0	對蜜蜂有劇毒性
99%礦物油乳劑	FRAC NC	介殼蟲類	200	免訂	免訂	
42%益洛寧可濕性粉劑	IRAC 1B IRAC 3A	薊馬	1,500	12	益滅松 1.0 賽洛寧 1.0	
20%亞滅培水溶性粉劑 ^⑤	IRAC 4A	薊馬	4,000	12	1.0	對蜜蜂有中等毒性
18.2%益達胺水懸劑 ^⑤	IRAC 4A	薊馬	4,000	12	1.0	對蜜蜂有劇毒性
20%達特南水溶性粒劑 ^⑤	IRAC 4A	薊馬	3,000	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性
50%陶斯松可濕性粉劑	IRAC 1B	薊馬	2,000	6	1.0	對蜜蜂有劇毒性
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	薊馬	1,500	12	0.5	對蜜蜂有劇毒性
40%加保福化利可濕性粉劑 ^⑤	IRAC 1A IRAC 3A	薊馬	2,000	12	加保利 0.5 福化利 1.0	
25%福化利乳劑	IRAC 3A	薊馬	3,000	18	1.0	
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	薊馬	1,000	6	1.0	對蜜蜂有劇毒性
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	薊馬	1,000	6	1.0	同上
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	薊馬	1,000	6	1.0	同上
48.34%丁基加保扶乳劑 ^⑤	IRAC 1A	薊馬	1,200	12	2.0	
3%亞滅寧水基乳劑	IRAC 3A	薊馬	1,000	6	2.0	
3%亞滅寧乳劑	IRAC 3A	薊馬	1,000	6	2.0	
100g/L賜派滅水懸劑 ^⑤	IRAC 23	薊馬	1,500	14	1.0	
20%覆滅蝸水溶性粉劑 ^⑤	IRAC 1A	薊馬	600- 800	14	0.4	
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5	薊馬	3,200	7	未訂	對蜜蜂有劇毒性
5.87%賜諾特水懸劑	IRAC 5	薊馬	1,600	7	未訂	同上

42% 益洛寧可濕性粉劑	IRAC 1B IRAC 3A	葉蟬	2,000	12	益滅松 1.0 賽洛寧 1.0	對蜜蜂有中等毒性
20% 亞滅培水溶性粉劑 ^⑤	IRAC 4A	葉蟬	4,000	12	1.0	同上
20% 達特南水溶性粒劑 ^⑤	IRAC 4A	葉蟬	3,000	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性
2.9% 貝他賽扶寧乳劑	IRAC 3A	葉蟬	1,500	6	0.5	同上
25% 賽速安水溶性粒劑 ^⑤	IRAC 4A	葉蟬	7,500	6	0.5	對蜜蜂有劇毒性
18.2% 益達胺水懸劑 ^⑤	IRAC 4A	葉蟬	6,000	9	1.0	避免施用於生長勢弱之幼苗，以免發生藥害。對蜜蜂有劇毒性
40% 加保福化利可濕性粉劑 ^⑤	IRAC 1A IRAC 3A	葉蟬	2,000	18	加保利 0.5 福化利 1.0	
2.8% 畢芬寧乳劑	IRAC 3A	葉蟬	2,000	9	1.0	對蜜蜂有劇毒性
2.5% 畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	葉蟬	2,000	9	1.0	同上
3% 亞滅寧水基乳劑	IRAC 3A	葉蟬	1,000	6	2.0	對蜜蜂有中等毒性
3% 亞滅寧乳劑	IRAC 3A	葉蟬	1,000	6	2.0	同上
2.5% 賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	葉蟬	4,000	6	1.0	對蜜蜂有劇毒性
2.46% 賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	葉蟬	4,000	6	1.0	同上
2.8% 賽洛寧乳劑	IRAC 3A	葉蟬	4,000	6	1.0	同上
46.5% 愛殺松水基乳劑	IRAC 1B	黑疣粉蝨	800	21	0.5	
85% 加保利可濕性粉劑 ^⑤	IRAC 1A	黑疣粉蝨	1,000	12	0.5	對蜜蜂有劇毒性
2.8% 第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	黑疣粉蝨	1,000	6	0.2	對蜜蜂有輕等毒性
2.8% 第滅寧乳劑	IRAC 3A	黑疣粉蝨	1,000	6	0.2	同上
26.8% 賽扶益達胺乳劑 ^⑤	IRAC 3A IRAC 4A	粉蝨類	5,000	6	賽扶寧 0.5 益達胺 1.0	對蜜蜂毒性
40% 納乃得水溶性粒劑	IRAC 1A	粉蝨類	900	12	2.0	
10% 芬普寧水懸劑	IRAC 3A	葉蟎類	1,000	9	1.0	具魚毒性
1% 密滅汀乳劑	IRAC 6	葉蟎類	1,500	6	0.2	對水中生物有劇毒性
10% 得芬瑞可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蟎類	2,000	7	1.0	同上

39.5%扶吉胺水懸劑	IRAC 29	葉蟎類	1,500	9	0.5	對水中生物有劇毒性
30%賜派芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,500	15	0.02	
240g/L賜滅芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,000	14	2.0	對水中生物有劇毒性
10%芬殺蟎乳劑	IRAC 21A	葉蟎類	1,500	7	0.1	對蜜蜂有中等毒性
15%芬殺蟎水懸劑	IRAC 21A	葉蟎類	2,500	7	0.1	同上
18.3%芬殺蟎水懸劑	IRAC 21A	葉蟎類	3,000	7	0.1	同上
5%芬普蟎水懸劑	IRAC 21A	葉蟎類	1,000	14	0.5	對水中生物有劇毒性
46.5%愛殺松水基乳劑	IRAC 1B	葉蟎類	800	21	0.5	
240/L 賜派芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,000	14	2.0	
10%依殺蟎水懸劑	IRAC 10B	葉蟎類	3,500	21	0.5	
100g/L益斯普水懸劑	IRAC 2B	蚜蟲類	3,000	6	0.2	對蜜蜂有劇毒性
50%安丹可濕性粉劑	IRAC 1A	蚜蟲類	1,000	9	1.0	
0.02%賜諾殺濃餌劑	IRAC 5	東方果實蠅	8	3	0.3	

*具有相同作用機制，應避免同時使用或輪替使用。

* ㊟ 系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

防檢局農藥資訊服務網



衛福部食品藥物管理署網頁



不同國家(區域)農產品中農藥殘留容許量標準查詢網站



輸美國番石榴病蟲草害防治用農藥參考基準

