



新聞資料

行政院農業委員會高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 110022 號

中華民國 110 年 7 月 20 日

烟花颱風來襲 高雄場籲請農友加強防範

根據中央氣象局預報，今年第 6 號颱風烟花持續增強，周四(22)起至周六是颱風最靠近臺灣的時候，南部地區受西南氣流的影響，預估會有豪雨等級的雨勢，由於颱風路徑仍有變化，高雄區農業改良場(以下簡稱高雄場)籲請農友密切注意氣象局最新預報資訊，加強防災準備以降低損害。

高雄場戴順發場長提醒農友，颱風常造成農作物倒伏或折損，導致作物葉片、花及果實損傷，及田區浸水等情況，需於風雨來襲前做好防範措施，以減少災損。易倒伏作物應加強立支柱固定；劇烈降雨或連續豪雨常造成田間浸水，提醒農友重新檢視園區排水溝有無再深掘疏通的需要，並即時清理園區殘枝、落果，以確保排水順暢；若正值施用化學肥料時期，應注意未來幾天天氣，若為有雨天氣，建議應分次減量施用，避免強降雨後肥料流失。

高雄場戴場長進一步指出，目前高屏地區二期水稻正值分蘖盛期，應維持排水暢通，待積水退去，暫時保持排水狀態，待植株挺立後再行灌水，如風勢較大造成葉片破損，應加強白葉枯病的防治工作。目前高雄金煌芒果、番石榴及紅龍果仍為採收期，應儘快採收適熟果實；至於陸續進入修剪及催花準備期的蓮霧果園，應儘速移除或粉碎修剪後枝條，避免阻礙了園區排水，如採用全株包覆式蓋網催花，更應密切注意颱風路徑，必要時提前卸網，避免枝葉破損。對於燈照產調已進入開花期，及未產調仍在培育枝梢的棗植株，建議加強固定防風網。

連續降雨容易造成病害或生理障礙，建議木瓜可提前疏果減輕植株負擔；紅龍果則容易發生濕腐病，花謝後應清除花瓣，可噴施 62.5% 賽普護汰寧粒劑 2,000 倍預防，以降低發病率。果菜類蔬菜在颱風、大雨來臨前，請儘快將適收果實採收銷售或貯藏，沒有防雨設施的葉菜類蔬菜更建議在雨前採收完畢。正值產期的瓜果、豆菜類容易發生疫病(俗稱水傷)或細菌性軟腐病，在風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀的 1,000 倍水溶液，以達預防疫病效果。另外，可以在風雨前後施用廣效性的 27.12% 三元硫酸銅水懸劑，配合清園及田間衛生管理，預防各類真菌及細菌性病害蔓延。

颱風前的預防措施，有助於降低可能發生的農作物災損，高雄場已成立各項作物技術服務團，提供專業技術諮詢服務，農友若有任何預防措施及災後復耕等相關技術問題，可逕洽高雄場，技術人員將竭誠為您服務。

相關網路資源：

- 植物保護手冊 <https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm>
- 高雄場作物安全用藥資訊 <https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665>
- 高雄場技術服務團
https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=8959
- 作物防災及復育措施
https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=7415

聯絡人：朱瑋君、陳思如助理研究員、周浩平、黃祥益副研究員

電話：08-7389158 轉 742、743、757 07-6622274 轉 101



果樹作物根部遭長時間淹水容易衰弱、死亡，應加強周邊排水系統通暢。



蓮霧正值催花準備期，應密切注意颱風動向，必要時卸下黑網，颱風遠離後再重新覆蓋。



風雨過後各類病害易蔓延，苦瓜易同時遭受真菌及細菌病害危害。



葉菜類蔬菜較不耐風雨，颱風來前應儘快採收。