

毛豆病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1120901 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收 期(天)	台灣安全容 許量(PPM)	備 註
23.2%賓克隆水懸劑	FRAC 20	苗立枯病	1,000		0.05	播種後澆灌 1 次，隔 10 天再施藥 1 次。
35%依得利可溼性粉劑	FRAC 14	幼苗疫病	3,000	未訂	0.5	濃度提高時會發生藥害。本病全年皆可發生，尤以高溫多濕時，最容易發病。禁止使用於豆苗與乾豆類。
25%依得利乳劑	FRAC 14	幼苗疫病	1,500	未訂	0.5	同上
1x10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑	FRACBM02	萎凋病	250	免訂	免訂	種子直播或幼苗定植後，10-14 天開始施用，以每株 250 毫升藥液量於植株莖基部或根圍進行土壤澆灌。 應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 11 FRAC 7	銹病	1,500	9	白克列 1.0 百克敏 0.5	禁止施用於豆苗上
75%嘉保信可濕性粉劑⑤	FRAC 7		1,500	6	5.0	
43.7%三氟敏水懸劑⑤	FRAC 11	銹病	3,000	7	0.08	
33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3	銹病	400	3		二硫代胺基甲酸鹽:豆菜類 2.5ppm
50%白克列水分散性粒劑	FRAC 7	白粉病	2,500	9	1.0	禁止施用於豆苗上
99%礦物油乳劑	FRAC NC		500	免訂	免訂	
80%碳酸氫鉀水溶性粉劑			1,000	免訂	免訂	
84.2%三得芬乳劑⑤	FRAC 5		3,500	9	1.0	

5%三泰隆可濕性粉劑⑤	FRAC 3	白粉病	2,000	3	2.0	
10.5%平克座乳劑⑤	FRAC 3		4,000	6	0.5	
24.9%待克利水懸劑⑤	FRAC 3		3,000	3	1.0	
250g/L 待克利乳劑⑤	FRAC 3	白粉病	3,000	3	1.0	
10% 待克利水分散性粒劑⑤	FRAC-3		800	3	1.0	
500g/L 氟殺克敏水懸劑	FRAC 7 FRAC 11		5,000	21	氟克殺 1.5 百克敏 0.5	
50%枯草桿菌可濕性粉劑	FRAC 44		800	免訂	免訂	避免與銅劑或抗生素混合使用
10%菲克利乳劑⑤	FRAC 3		4,000	9	0.3	
11.6%四克利水基乳劑⑤	FRAC 3	白粉病	1,500	2	2.0	對水中生物有毒性
22.58%快諾芬水懸劑	FRAC13,E1		4,000	2	1.0	對水中生物有毒性
48%松香酯銅乳劑	F-Chem-11	露菌病	1,000	免訂	免訂	
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11		1,000	14	0.5	
35%滅達樂種子處理水分散性粉劑⑤	FRAC 4		拌種用	未訂	2.0	藥劑:水=3:10 藥劑配成漿狀，與種子拌勻後播種。
1 x 10 ⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿菌 QST713 水懸劑	FRAC BM02		400	免訂	免訂	病害發生初期開始施藥
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11	炭疽病	1,000	14	0.5	
23.6%百克敏乳劑	FRAC 11		3,000	7	0.5	
325g/亞托待克利水懸劑⑤	FRAC3, 11		2,000	7	亞托敏 0.5 待克利 1.0	

24.9%待克利乳劑⑤	FRAC 3	炭疽病	3,000	3	1.0	
24.9%待克利水懸劑⑤	FRAC 3		3,000	3	1.0	
250g/L 待克利乳劑⑤	FRAC 3		3,000	3	1.0	
10%待克利水分散性粒劑⑤	FRAC 3		800	3	1.0	
75%四氯異苯腈可濕性粉劑	FRAC M5		600	6	5.0	
40%四氯異苯腈水懸劑	FRAC M5		300	6	5.0	
27.3%三氟得克利水懸劑⑤	FRAC 11 FRAC 3		2,500	12	三氟敏 0.08 得克利 0.5	
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11	疫病	1,000	14	0.5	
63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑	FRAC M1		400	免訂	免訂	避免與石灰硫磺或礦物油混合使用
75%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	FRAC M1		500	免訂	免訂	同上
15%福多寧乳劑⑤	FRAC 7	白絹病	900	14	1.0	
20%福多寧水懸劑⑤	FRAC 7		1,200	14	1.0	
50%福多寧可濕性粉劑⑤	FRAC 7		3,000	14	1.0	
300g/L 氟克殺水懸劑	FRAC 7,C2	黑斑病	5,000	7	1.5	
500g/L 氟殺克敏水懸劑	FRAC 7 FRAC 11	灰黴病	5,000	21	氟克殺 1.5 百克敏 0.5	
5×10 ⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可溼性粉劑	FRACBM02	葉斑病 葉枯病 褐斑病	600	-	-	藥液需均勻噴施於植株全株

27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	葉部細菌 性病害	500	免訂	免訂	具魚毒性。病害發生初期開始施藥
20%維利黴素溶液	FRAC 26	葉燒病	1,200	免訂	免訂	延伸使用
1×10 ⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢 桿菌 BF 可溼性粉劑	FRAC BM02	葉燒病	600	免訂	免訂	病害發生初期開始施藥
75%賽滅淨可濕性粉劑⑤	IRAC 17	潛蠅類	5,000	6	1.0	
8.9%賽滅淨溶液⑤			1,000	7	1.0	
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A		2,000	3	1.0	
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	潛蠅類	2,000	3	1.0	
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A		2,000	3	1.0	
10%福瑞松粒劑⑤	IRAC 1B		10kg/公 頃	種植前 施用	0.05	將藥劑與適量之砂土混拌後均勻施於 植溝中，覆土 3 公分後種植。土壤須保 持濕潤才能發揮藥效。生長期不可施用
0.5%可尼丁粒劑⑤	IRAC 4A		60kg/公頃	6	0.1	播種後 21 天畦上施藥
40%賽速安勃水分散性粒 劑⑤	IRAC 4A IRAC 28	蝶蛾類	5,000	6	賽速安 0.02 剋安勃 0.5	
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A		2,000	3	1.0	
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A		2,000	3	1.0	
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A		2,000	3	1.0	
50%馬拉松乳劑	IRAC 1B		500	4	2.0	不可與鹼性藥劑混用
22%美氟綜水懸劑	IRAC 22B	蝶蛾類	1,000	15	1.0	
5%因滅汀水溶性粒劑	IRAC 6		3,500	3	0.02	
2.15%因滅汀乳劑	IRAC 6		1,500	3	0.02	

14.5%因得克水懸劑	IRAC 22A	蝶蛾類	2,000	6	0.5	
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B		800	10	1.0	避免與石灰硫磺劑混合使用
10%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC 3A		3,000	9	0.5	
5%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC 3A		1,500	9	0.5	
5%賽滅寧水基乳劑	IRAC 3A		1,500	9	0.5	
18.4%剋安勃水懸劑	IRAC 28		2,500	6	0.5	
35%剋安勃水分散性粒劑	IRAC 28	蝶蛾類	5,000	6	0.5	
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5		1,200	7	未訂	
20%芬化利水基乳劑	IRAC 3A		3,000	14	0.1	
34%硫敵克水懸劑⑤	IRAC 1A		1,000	14	1.0	
25%二福隆可濕性粉劑	IRAC 15		1,500	14	1.0	
33%佈飛百滅寧乳劑	IRAC 1B IRAC 3A		1,000	10	佈飛松 1.0 百滅寧 1.0	
58%乃力松乳劑	IRAC 1B		1,000	4	0.5	
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A		1,000	3	1.0	
54%鮎澤蘇力菌水分散性粒劑	IRAC 11A		1,000	免訂	免訂	
40%納乃得水溶性粉劑	IRAC 1A		1,500	7	0.5	
54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	FRAC BM02 IRAC 11A	蝶蛾類	1,000	-	-	害蟲發生時開始施藥
48.1%鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性粒劑	FRAC BM02 IRAC 11A		1,000	-	-	害蟲發生時開始施藥

2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	蝶蛾類	1,000	7	1.0	對蜜蜂有劇毒性
2%阿巴汀乳劑	IRAC 6		2,000	7	0.08	對蜜蜂有劇毒性
5.0%可芬諾水懸劑	IRAC 18		1,000	14	2.0	
22%美氟綜水懸劑	IRAC 22B		1,000	15	1.0	
4.4%祿芬隆乳劑	IRAC 15		1,500	7	1.0	對蜜蜂有毒性
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	薊馬類	2,000	3	1.0	
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A		2,000	3	1.0	
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A		2,000	3	1.0.	
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A		1,000	3	1.0	
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A		1,000	3	1.0	
9.6%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A		1,500	9	3.0	
9.6%益達胺溶液⑤	IRAC 4A		1,500	9	3.0	
25%福化利乳劑	IRAC 3A	薊馬類	3,000	7	0.5	
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B		800	10	1.0	避免與石灰硫磺劑混合使用
2.9%貝他-賽扶寧乳劑	IRAC 3A		1,500	9	0.5	
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A		4,000	6	1.0	
2.5%賜諾殺水懸劑	IRAC 5		1,000	3	0.3	
11.6%賜諾殺水懸劑	IRAC 5	薊馬類	4,500	3	0.3	
80%賜諾殺可濕性粉劑	IRAC 5		32,000	3	0.3	
5.87%賜諾特水懸劑	IRAC 5		4,000	7	未訂	
100g/L 賜派滅水懸劑	IRAC 23		1,000	7	1.5	
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	粉蟲類	3,000	9	0.5	

28.8%益達胺溶液	IRAC 4A	粉蟲類	4,500	21	3.0	
9.6%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A		1,500	9	3.0	
9.6%益達胺溶液⑤	IRAC 4A		1,500	9	3.0	
25%派滅淨可濕性粉劑⑤	IRAC 9B		2,000	21	0.5	
0.5%可尼丁粒劑⑤	IRAC 4A		60kg/公頃	6	0.1	播種後 21 天畦上施藥
25%賽速安水溶性粒劑⑤	IRAC 4A		2,000	6	0.02	
100g/L 賜派滅水懸劑	IRAC 23		1,000	7	1.5	
11%百利普芬乳劑	IRAC 7C		1,000	9	0.2	具魚毒性
10%福瑞松粒劑⑤	IRAC 1B	蚜蟲類	10kg/ 公頃	限種植前 施用	0.05	藥劑均勻施於植溝，覆土後播種， 土壤保持濕度易發揮藥效。
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A		1,000	3	1.0	
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A		1,000	3	1.0	
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A		1,000	7	0.2	
10%氟尼胺水分散性粒劑	IRAC 29		4,000	7	2.0	
1.0%密滅汀乳劑	IRAC 6	葉蟬類	1,500	7	0.2	
20%畢達本可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蟬類	2,000	14	0.1	
5%芬普蟎水懸劑	IRAC 21A		2,000	14	2.0	
10%福瑞松粒劑⑤	IRAC 1B	葉蟬類	10kg/ 公頃	限種植前 施用	0.05	藥劑均勻施於植溝，覆土後播種， 土壤保持濕度易發揮藥效。
5%芬普蟎水懸劑	IRAC 21A	葉蟬類	2,000	21	2.0	
41%嘉磷塞異丙胺鹽溶液⑤	HRAC G	雜草	100-120	未訂	0.2	限毛豆園使用 不可噴及作物，以免發生藥害。限

						萌芽前使用，不可噴及作物。防除對象：巴拉草、香附子、白茅、雙穗雀稗、毛穎雀稗等
13.5%固殺草溶液⑤	HRAC H	雜草	3L/公頃	未訂	0.2	不可噴及作物，以免發生藥害 限開花前使用
38.7%施得圃膠囊懸著劑⑤	HRAC K1	雜草	2.5L/公頃	未訂	0.1	播種覆土後將藥劑均勻噴施於土壤表面，施藥時田間應保持濕潤狀態。
13.2%剋草同乳劑⑤	HRAC A	禾本科 雜草	0.8L/公頃	未訂	0.2	僅對禾本科雜草有效 限開花前使用
5.3%得殺草乳劑⑤	HRAC A	禾本科 雜草	1L/公頃	未訂	1.0	同上
12.5%西殺草乳劑⑤	HRAC A	禾本科 雜草	2L/公頃	未訂	10.0	禾本科雜草 3-5 葉時噴施於雜草上。

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。要選擇不同作用機制的農藥輪替使用。

*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

外銷農產品用藥基準



衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



外銷毛豆病蟲草害防治用藥參考基準



生物農藥查詢平台

