

竹病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1120901 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收 期（天）	台灣安全 容許量(ppm)	備 註
85%邁隆可濕性粉劑	unknown	細菌性 萎凋病	500	-	-	自產筍期前 1 個月開始，至收穫完畢 為止，每隔 15 天施藥 1 次。
0.5%可尼丁粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	9 公斤/ 分地	3	0.02	施藥前要先把基部落葉剷除，施藥後 應灌水保持土壤濕度。
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	6,000	6	0.5	
18.2%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	8,000	6	0.5	
5%賽扶寧水基乳劑	IRAC 3A	蚜蟲類	2,000	9	0.5	對蜜蜂毒性強
5.7%賽扶寧乳劑	IRAC 3A	蚜蟲類	2,000	9	0.5	同上
50%培丹水溶性粉劑⑤	IRAC 14	蚜蟲類	1,000	10	0.1	
2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,000	6	0.05	
2.8%第滅寧乳劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,000	6	0.05	
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,000	6	0.05	
31.6%護賽寧乳劑	IRAC 3A	蚜蟲類	8,500	21	0.5	
5%護賽寧溶液	IRAC 3A	蚜蟲類	1,500	21	0.5	

20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	2,000	6	0.05	
10%賽速安水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	2,000	14	0.25	
40%納乃得水溶性粒劑⑤	IRAC 1A	蚜蟲類	1,250	21	1.0	
21.8%速殺氟水懸劑	IRAC 4C	蚜蟲類	6,000	6	0.03	對蜜蜂有劇毒性
5.7%賽扶寧乳劑	IRAC 3A	竹捲葉蛾類	250	9	0.5	對蜜蜂毒性強
30%撲芬松乳劑	IRAC 1B	竹盲椿象	1,500	未訂	撲滅松 0.05 芬化利 0.1	同一地區以施行共同防治效果較佳， 施藥竹林不得採葉。
20%芬化利乳劑	IRAC 3A	竹盲椿象	2,000	未訂	0.1	同上
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	竹象鼻蟲類	3,000	6	0.05	
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	竹象鼻蟲類	1,000	12	0.05	
50%培丹水溶性粉劑⑤	IRAC 14	竹象鼻蟲類	1,000	10	0.1	
20%依芬寧可濕性粉劑	IRAC 3A	蝶蛾類	1,500	14	未訂	
10%依芬寧乳劑	IRAC 3A	蝶蛾類	750	14	未訂	
100g/L 諾伐隆水分散性乳劑	IRAC 15	蝶蛾類	1,500	21	未訂	
22.6%滅芬諾水懸劑	IRAC 18	夜蛾類 毒蛾類	2,000	28	0.5	使用本藥劑後不可與根菜類作物輪作，以免蓄積殘留

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。

*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

外銷農產品用藥基準



生物農藥查詢平台



衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)

