

## 檳榔病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1120901 修訂

| 藥劑名稱                 | 作用機制<br>代碼            | 防治<br>病蟲害 | 稀釋<br>倍數 | 安全採收<br>期(天) | 安全容許<br>量(PPM)  | 備註                                                       |
|----------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 23.6%百克敏乳劑           | FRAC 11               | 炭疽病       | 3,000    | 7            | 1.5             |                                                          |
| 62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑⑤    | FRAC 9,12             | 炭疽病       | 2,000    | 21           |                 | 病害發生初期開始施藥<br>賽普洛-其他(蔬果類) 0.01ppm<br>護汰寧-其他(蔬果類)-0.01ppm |
| 240 G/L 福化利水基乳劑      | FRAC 2                | 花薊馬類      | 3,000    | 7            | 0.8             |                                                          |
| 70%庫斯蘇力菌 SA-12 可濕性粉劑 | FRAC BM02<br>IRAC 11A | 椰子綴蛾      | 600      | 免訂           | 免訂              |                                                          |
| 20%亞滅培水溶性粉劑⑤         | IRAC 4A               | 椰子綴蛾      | 2,000    | 60           | 其他(蔬果類)-0.01ppm | 對蜜蜂有中等毒性。檳榔花苞形成初期開始施藥。請於傍晚施藥。施藥時請注意人員安全防護。               |
| 150g/L 賜派滅水分散性油懸劑⑤   | IRAC 23               | 椰子綴蛾      | 1,000    | 60           |                 | 檳榔花苞形成初期開始施藥。施藥時請注意人員安全防護。                               |
| 9%培丹粒劑⑤              | IRAC 14               | 椰子綴蛾      | 1,000    | 60           |                 | 對水中生物有劇毒性。檳榔花苞形成初期開始施藥。請於傍晚施藥。施藥時請注意人員安全防護。              |

\*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

\*⑤ 系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

外銷農產品用藥基準

衛福部食品藥物管理署網頁

農藥資訊服務網

無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。