

木瓜病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1130102 修訂

藥劑名稱	作用機制	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	安全容許量 (PPM)	備 註
50%達滅芬可濕性粉劑	FRAC 40	果疫病	3,000	9	1.0	
50%達滅芬水懸劑	FRAC 40	果疫病	3,000	9	1.0	
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11	果疫病	1,000	9	1.0	
9.4%賽座滅水懸劑	FRAC 21	果疫病	2,000	12	0.5	
純白鏈黴素 700PCU/g 水溶性粉劑	FRAC BM02	果疫病	800	免訂	免訂	雨季來臨前施藥。預防性藥劑，宜於發病前開始施用。
81.3%嘉賜銅可濕粉劑⑤	FRAC 24 FRAC M1	果疫病	1,000	6	嘉賜黴素 未訂 鹼性氣氧化銅 免訂	
60.8%氟比拔克水懸劑	FRAC 43 FRAC 28	果疫病	1,000	14	氟比來 2.0 普拔克 10.0	
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	果疫病	800	免訂	免訂	
280g/L 曼普歐西比水懸劑⑤	FRAC 40 FRAC 49	果疫病	5,000	14	曼普胺 0.8 歐西比 0.1	病害發生初期開始施藥
40%貝芬依滅列可濕性粉劑⑤	FRAC 1 FRAC 3	白粉病	2,000	6	貝芬替 1.0 依滅列 1.0	
10.5%平克座乳劑⑤	FRAC 3	白粉病	2,000	3	0.5	
18%賽福寧乳劑⑤	FRAC 3	白粉病	1,000	未訂	0.5	
50%免賴得可濕性粉劑⑤	FRAC 1	白粉病	3,000	18	1.0	
75%快得保淨可濕性粉劑⑤	FRAC M1 FRAC 1	白粉病	600	18	快得寧 2.0 甲基多保淨 1.0	

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

25%蟬離丹可濕性粉劑	IRAC UNB	白粉病	2,000	18	0.1	
25%普克利乳劑⑤	FRAC 3	白粉病	2,000	6	2.0	
30%無水硫酸銅可溼性粉劑	FRAC M1	白粉病	1,000	免訂	免訂	
40%克熱淨（烷苯磺酸鹽） 可溼性粉劑	FRAC M7	白粉病	1,500	21	0.3	
15%得克芬胺乳劑⑤	FRAC 3 FRAC U6	白粉病	2,000	9	得克利 0.5 賽芬胺 1.0	
37.5%硫黃芬胺水懸劑	FRAC U6	白粉病	2,500	7	賽芬胺 0.1	高溫易產生藥害
500g/L 氟殺克敏水懸劑	FRAC 7,11	白粉病	6,000	14	氟克殺 0.4 百克敏 0.5	病害發生初期開始施藥 具魚毒性
23.7%依普同水懸劑	FRAC 2	蒂腐病	1,000	21	2.0	
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7 FRAC 11	炭疽病	1,500	12	白克列 1.0 百克敏 0.5	
62.5%賽普護汰寧水分散性 粒劑⑤	FRAC 9 FRAC 12	炭疽病	1,500	9	賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	發病季節著果後施藥
80%福賽快得寧可濕性粉劑⑤	FRAC 33 FRAC M1	炭疽病	1,200	6	福賽得 20.0 快得寧 2.0	
70%甲基鋅乃浦可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	400	9	2.5	
70%甲基多保淨可濕性粉劑⑤	FRAC 1	炭疽病	1,000	6	1.0	
23.6%百克敏水懸劑	FRAC 11	炭疽病	3,000	12	0.5	開花初期施藥
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11	炭疽病	2,500	9	1.0	
40%克熱淨（烷苯磺酸鹽） 可溼性粉劑	FRAC M7	炭疽病	1,500	21	0.3	
25.9%得克利水基乳劑⑤	FRAC 3	炭疽病	1,500	6	0.5	於開花初期施用
80%免得爛水分散性粒劑	FRAC M3	炭疽病	500	21	2.5	
43.7%三氟敏水懸劑	FRAC 11	炭疽病	4,000	18	0.5	於開花初期施用

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

325g/L 亞托待克利水懸劑⑤	FRAC 3 FRAC 11	炭疽病	3,000	21	亞托敏 1.0 待克利 0.5	
500g/L 三氟派瑞水懸劑	FRAC 11 FRAC 7	炭疽病	4,000	18	三氟敏 0.5 氟派瑞 0.8	
硼砂 2.5 公斤		缺硼	400			先以熱水溶解
硼酸 2.5 公斤		缺硼	400			不得提高濃度以免發生藥害
50%馬拉松水基乳劑	IRAC 1B	介殼蟲類	500- 1,000	3	1.0	
99%礦物油乳劑	FRAC NC	介殼蟲類	200	免訂	免訂	高溫下提高施用濃度，可能引起植株幼嫩部位發生藥害。建議傍晚使用，避免造成日燒藥害。剩餘藥劑請勿重覆噴施，以免藥量過高，而發生藥害。
100g/L 賜派滅水懸劑⑤	IRAC 23	介殼蟲類	1,500	10	0.4	對蜜蜂有毒性
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	介殼蟲類	2,000	15	1.0	對蜜蜂劇毒性，避免花期使用
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	介殼蟲類	2,500	7	1.0	對蜜蜂中等毒性，避免花期施用
21.8%速殺氟水懸劑	IRAC 4C	介殼蟲類	3,000	14	0.5	對蜜蜂劇毒性，避免花期使用
26.8%賽扶益達胺乳劑⑤	IRAC 3A IRAC-4A	粉蟲類	5,000	6	賽扶寧 0.2 益達胺 0.5	同上
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	粉蟲類	1,000	12	0.2	對蜜蜂有輕等毒性
2.8 第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	粉蟲類	1,000	12	0.2	同上
18.2%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	8,000	6	0.5	對蜜蜂劇毒性，避免花期使用
10%賽速安水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	3,000	21	0.4	同上
1%賽洛寧可溼性粉劑	IRAC 3A	蚜蟲類	700	6	1.0	同上
4%畢汰芬水懸劑	IRAC 21A	葉蟬類	3,000	6	0.1	對蜜蜂劇毒性，避免花期使用
42%克芬蟎水懸劑	IRAC 10A	葉蟎類	4,000	15	2.0	

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

20%賽芬蟎水懸劑	IRAC un	葉蟎類	2,000	12	1.0	
10%得芬瑞可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蟎類	2,000	6	0.5	
30%賜派芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,500	6	0.5	
5%合芬寧膠囊懸著液	IRAC 3A	葉蟎類	500	6	0.5	
18.3%芬殺蟎水懸劑	IRAC 21A	葉蟎類	3,000	12	0.5	
10%依殺蟎水懸劑	IRAC 10B	葉蟎類	3,500	3	0.2	
1%密滅汀乳劑	IRAC 6	葉蟎類	1,500	6	0.2	
10%芬普寧水懸劑	IRAC 3A	葉蟎類	1,000	9	1.0	
10%芬殺蟎乳劑	IRAC 21A	葉蟎類	1,500	12	0.5	
15%芬殺蟎水懸劑	IRAC 21A	葉蟎類	2,500	12	0.5	
15%亞醃蟎水懸劑	IRAC 20B	葉蟎類	1,500	14	1.0	
240g/L 賜滅芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,000	7	1.0	施用時須注意避免幼嫩葉片接觸過量藥劑
30%賽派芬水懸劑	IRAC 25A	葉蟎類	2,500	3	0.3	於葉蟎發生達 10 隻時施藥 1 次
37%第滅達胺水懸劑⑤	IRAC 3A IRAC 4A	薊馬類	2,000	12	第滅寧 0.2 益達胺 0.5	對蜜蜂劇毒性，避免花期施用
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5	薊馬類	3,200	12	0.2	對蜜蜂劇毒性，避免花期使用
16%可尼丁水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	3,000	10	0.01	對蜜蜂劇毒性，避免花期使用
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	2,500	7	1.0	對蜜蜂具中等毒性
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	3,000	10	1.0	對蜜蜂劇毒性，避免花期使用
40%三落松乳劑	IRAC 1B	斑潛蠅類	1,000	14	0.5	

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。

*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。