

水稻病害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1130102 修訂

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	備 註
25.9%得克利水基乳劑⑤	FRAC 3, G1	稻種消毒 (可消滅附在稻種上的稻熱病、徒長病、胡麻葉枯病、條葉枯病及小粒菌核病等病原菌，以減輕在苗床和本田發病機會。)	2,000	-	0.05	稻種直接消毒 24 小時候，再浸水催芽
50%免賴得可濕性粉劑⑤	FRAC 1, B1		1,000	-	0.5	稻種先浸水至萌芽時即浸於該藥液內 4-12hr，並予攪動提高藥效。稻種消毒後不必水洗即可播種。藥液調配後 24hr.內，可連續施用 3 次
40%免賴地可濕性粉劑⑤	FRAC 1, B1 FRAC M3		1,000	-	免賴得 0.5 得恩地 0.5	萌芽時稻種消毒
80%多得淨可濕性粉劑⑤	FRAC 1, B1 FRAC M3		800	-	甲基多保淨 0.5 得恩地 0.5	
25%撲克拉水基乳劑	FRAC 3, G1		1,000	-	0.5	浸漬時間：24 小時。稻種預先浸水 4 小時後浸漬於藥液中並時予攪動。消毒後直接浸種催芽。藥液可再使用一次。稻種直接消毒 24 小時候，再浸水催芽。
41.8%腐絕水懸劑⑤	FRAC 1, B1		2,000	-	2.0	萌芽時防徒長病。浸藥時間 1-6 小時。稻種預先浸水催芽，以藥劑浸漬之。消毒後即可播種。藥劑可以連續使用 2 次。
9.4%賽座滅水懸劑	FRAC 21, C4	育苗箱秧苗立枯病	1,000	-	未訂	限育苗箱使用
2.5%右滅達樂粒劑	FRAC 4, A1	育苗箱秧苗立枯病	2g/箱		1.0	

17.5%滅達樂溶液	FRAC 4, A1	育苗箱秧 苗立枯病	1,000	-	1.0	
35%本達樂可濕性粉劑	FRAC 4, A1		2,000	-	0.2	
34%殺紋滅達樂溶液⑤	FRAC 32, A3 FRAC 4, A1	育苗箱秧 苗立枯病	1,250	-	殺紋寧 1.0 滅達樂 1.0	
30%殺紋寧溶液⑤	FRAC 32, A3		1,000	-	1.0	
25%依得利乳劑	FRAC 14, C3	育苗箱秧 苗立枯病	2,000	-	0.1	
21%賽氟滅水懸劑⑤	FRAC 7, C2		1,500	-	0.2	
17.7% 安美速水懸劑	FRAC 21		2,000		0.02	限育苗箱使用
1x10 ^{*10} CFU/mL 枯草桿菌 WG6-14 液劑	FRAC BM02	稻苗 徒長病	200	免訂	免訂	2.5ml/箱 不可與銅劑、抗生素、殺菌劑 混合使用。
20%披扶座可濕性粉劑⑤	FRAC 3, G1	稻苗 徒長病	20	-	未訂	稻種：藥液=1：2， 浸漬 10 分鐘。
41.8%腐絕水懸劑⑤	FRAC 1, B1		2,000		2.0	催芽前施藥。浸藥 24 小時消 毒後再浸水催芽。限育苗箱秧 苗使用。藥液可以連續使用 2 次。
200g/L 亞汰尼種子處理用水 懸劑	FRAC P3	稻熱病- 種子處理	10ml/kg 稻種	-	0.3	具呼吸中等毒性、皮膚過敏性
4%加普胺粒劑	FRAC16.2, I2	稻熱病-	30g/箱	-	1.0	限育苗箱使用。40%亞賜圃可 濕性粉劑，使用時期為育苗中 期施藥。
40%亞賜圃可濕性粉劑⑤	FRAC 6, F2	育苗箱處理	20g/箱	-	2.0	
75%三賽唑可濕性粉劑	FRAC16.1, I1	稻熱病- 育苗箱處理	2g/箱	-	3.0	
4%撲殺熱粒劑⑤	FRAC P, P2	稻熱病- 育苗箱處理	40g/箱	-	0.5	
5%嘉賜黴素可濕性粉劑⑤	FRAC 24, D3	稻熱病- 本田處理	3,000	14	0.04	

1*10 ⁹ CFU/G 枯草桿菌 KHY8 可濕性粉劑	FRAC BM02	稻熱病- 本田處理	400	免訂	免訂	於稻作插秧後 15 天、30 天、 40 天孕穗期及齊穗期，各施 用 1 次。
26.8%嘉賜圃可濕性粉劑⑤	FRAC 24, D3 FRAC 6, F2	稻熱病- 本田處理	1,500	21	嘉賜黴素 0.2 亞賜圃 2.0	
40%甲基多保淨水懸劑⑤	FRAC 1, B1	稻熱病- 本田處理	1,000	21	0.5	
20%芬諾尼水懸劑⑤	FRAC 16.2, I2		1,500	21	1.0	
33%克枯三賽唑可濕性粉⑤	FRAC34,un03 FRAC16.1, I1		1,000	35	克枯爛 0.2 三賽唑 3.0	本藥劑混合賓克隆等農藥，可 能發生藥害。
14%嘉賜克枯爛可濕性粉劑 ⑤	FRAC 24, D3 FRAC 34,un03		1,500	14	嘉賜黴素 0.2 克枯爛 0.2	本藥劑混合賓克隆、三賽唑等 農藥，易發生藥害。不可與強 酸或強鹼性藥劑混合使用。
33%克熱賜圃可濕性粉劑⑤	FRAC M7 FRAC 6, F2	稻熱病- 本田處理	1,500	21	克熱淨 0.05 亞賜圃 2.0	
15%加普胺水懸劑⑤	FRAC 16.2, I2		2,000	14	1.0	
45%嘉賜三賽唑水懸劑⑤	FRAC 24, D3 FRAC 16.1, I1		3,000	21	嘉賜黴素 0.2 三賽唑 3.0	
50%富米熱斯可濕性粉劑	FRAC 29, C5 FRAC 16.1, I1	稻熱病- 本田處理	1,000	7	富米綜 1.0 熱必斯 1.0	
54%保米熱斯可濕性粉劑	FRAC 23, D2 FRAC 16.1, I1	稻熱病- 本田處理	1,500	12	保米黴素 免訂 熱必斯 1.0	
50%護粒三賽唑可濕性粉劑	FRAC 6, F2 FRAC 16.1, I1	稻熱病- 本田處理	1,500	15	護粒松 0.1 三賽唑 3.0	
10%撲殺培丹粒劑⑤	FRAC P, P2 IRAC 14	稻熱病- 本田處理	30kg/ 公頃	20	撲殺熱 0.5 培丹 1.0	

45%喜樂克拉乳劑⑤	FRAC 6, F2 FRAC 3, G1	稻熱病- 本田處理	1,200	14	丙基喜樂松 0.2 撲克拉 0.5	
40%亞賜圃可濕性粉劑⑤	FRAC 6, F2	稻熱病- 本田處理	1,500	14	2.0	本藥劑試驗時加展著劑新利農 3000 倍
5%百快隆粒劑⑤	FRAC 16.1,I1	稻熱病- 本田處理	40kg/ 公頃	7	0.5	
4%保米黴素可濕性粉劑	FRAC 23, D2	稻熱病- 本田處理	1,000	7	免訂	
21.4%保米賜圃乳劑⑤	FRAC 23, D2 FRAC 6, F2	稻熱病- 本田處理	1,000	25	保米黴素 免訂 亞賜圃 2.0	
2%嘉賜黴素溶液⑤	FRAC 24, D3	稻熱病- 本田處理	1,000	14	0.2	
35%護粒丹可濕性粉劑	FRAC 6, F2 FRAC 16.1,I1		1,000	-	護粒松 0.1 熱必斯 1.0	
50%護粒松乳劑	FRAC 6, F2	稻熱病- 本田處理	1,000	21	0.1	插秧後施藥
50%護粒松乳劑	FRAC 6, F2	稻熱病- 本田處理	250 (動力微 粒噴霧 機)	21	0.1	噴藥前調節動力微 粒噴霧機至 最大風 速，以水 2.5 公升（施 藥量 1 公升稀 釋 250 倍）或 3 公升（施藥量 1.2 公升稀釋 250 倍）試噴 0.01 公頃稻株，能全 部均勻噴射後再行大面積噴 藥。無風或微風時，動力微粒噴 霧機之噴口須順風向噴藥，人行 方向與風向成直角，噴口宜比一 般噴法稍為提高成水平，其有效 射程約為 5~7 公尺。

6%撲殺熱粒劑⑤	FRAC P, P2	稻熱病- 本田處理	30kg/ 公頃	-	0.5	葉稻熱病發生前 7~10 天(插秧 後約 30 天)施藥一次。
21.2%嘉賜熱可濕性粉劑⑤	FRAC 24, D3 FRAC 16.1,11		1,500	-	嘉賜黴素 0.2 熱必斯 1.0	
43%嘉賜貝芬混合可濕性粉 劑⑤	FRAC 24, D3 FRAC 1, B1		1,000	21	嘉賜黴素 0.2 貝芬替 0.5	
50%熱必斯可濕性粉劑	FRAC 16.1,11		1,200	30	1.0	
41.7%三賽唑水懸劑	FRAC 16.1,11		1,500	25	3.0	
525g/L 普克三賽唑濃懸乳劑	FRAC 3,G1 FRAC 16.1,11	稻熱病- 本田處理	3,000	25	普克利 1.0 三賽唑 3.0	稻熱病害發生初期開始施 藥，每次間隔 7 天，共施用 2 次
17%丙基喜樂松粒劑⑤	FRAC 6, F2		60kg/ 公頃	-	0.2	
33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3	稻熱病- 本田處理	400	20	0.5	
25%克熱淨溶液	FRAC M7		1, 200	23	0.05	
12%撲殺賜圃粒劑⑤	FRAC P, P2 FRAC 6, F2	稻熱病- 本田處理	30kg/ 公頃	39	撲殺熱 0.5 亞賜圃 2.0	
43.7%三氟敏水懸劑	FRAC 11, C3	紋枯病	稻種 消毒	-	0.2	藥劑與水混合後再拌種。 稻種:藥劑:水=1kg:6ml:9ml 芽長度不超過 0.5 毫米，即和 藥液混拌均勻。混拌藥液之稻 種，靜置 10-15 分鐘，使藥液 完成附著於稻種。
240g/L 平氟芬種子處理用水 懸劑	FRAC 7			-	0.01	藥劑與水混合後再拌種。 稻種:藥劑:水=1kg:8ml:7ml
21%賽氟滅水懸劑⑤	FRAC 7, C2		3,000	14	0.2	
7.5%依普座乳劑⑤	FRAC 3, G1		1,000	10	0.5	
23%菲克利水懸劑⑤	FRAC 3, G1		4,000	14	0.1	

10.7%四克利乳劑⑤	FRAC 3, G1	紋枯病	1,000	14	0.2	
25%賓得克利水懸劑⑤	FRAC 20, B4 FRAC 3, G1		2,000	14	賓克隆 0.5 得克利 0.05	
1.5%福拉比粒劑⑤	FRAC 7, C2		20kg/ 公頃	15	0.1	
15%福多寧乳劑⑤	FRAC 7, C2		1,500	14	1.0	
20%達滅淨可濕性粉劑	FRAC37,un06	紋枯病	1,500	14	1.0	
24.9%待克利水懸劑⑤	FRAC 3, G1		3,000	7	0.5	
23.2%賓克隆水懸劑	FRAC 20, B4		2,000	7	0.5	
10%維利黴素溶液	FRAC 26, H3		2,500	免訂	免訂	
55%貝芬同可濕性粉劑⑤	FRAC 1, B1 FRAC 2, E3	紋枯病	1,000	14	貝芬替 0.5 依普同 1.5	
75%貝芬普寧可濕性粉劑⑤	FRAC 1, B1 FRAC 7, C2		750	10	貝芬替 0.5 滅普寧 1.0	
40%滅普寧水懸劑⑤	FRAC 7, C2	紋枯病	1,200	21	1.0	
30%殺紋寧溶液⑤	FRAC 32, A3		500	-	1.0	易引起不孕現象，抽穗前 10 天，應即停止施藥。
3%保粒黴素溶液⑤	FRAC 19, H4		1,000	-	免訂	
15.25%賽氟菲克利水分散性 粒劑⑤	FRAC 7, C2 FRAC 3, G1		1,500	15	賽氟滅 0.2 菲克利 0.1	
500g/L 待普克利乳劑⑤	FRAC 3, G1 FRAC 3, G1		3,000	21	待克利 0.5 普克利 1.0	病害發生初期開始施藥，間隔 14 天，連續施用 2 次
1*10 ⁸ CFU/G 蕈狀芽孢桿菌 AGB01 可濕性粉劑	FRAC BM02	紋枯病	20	-	-	插秧後 14 天開始施藥，每次 間隔 10 天，共施用 3 次。使 用前先以水稀釋 20 倍，靜置 過夜後，再稀釋至目標體積， 之後進行全株噴灑。

1*10 ⁸ CFU/ML 枯草桿菌 Y1336 液劑	FRAC BM02	紋枯病	400	-	-	分蘗盛期及抽穗期各施藥 1 次。藥液應均勻噴施於全株，特別是地際部分及葉鞘
400g/L 滅芬座水懸劑	FRAC 3	紋枯病	3,200	14	0.15	病害發生初期開始施藥
53%維利熱必斯可濕性粉劑	FRAC 26, H3 FRAC 16.1,11	紋枯病+ 稻熱病	1,000	14	維利黴素 免訂 熱必斯 1.0	
50%免賴得可濕性粉劑⑤	FRAC 1, B1	紋枯病+ 稻熱病	1,500	-	貝芬替 0.5	第一次施藥後隔 14 天左右孕穗初期再施藥一次。*貝芬替之容許含量適用於免賴得、甲基多保淨產生代謝物之貝芬替殘留、或直接使用貝芬替之殘留
25%普克利乳劑⑤	FRAC 3, G1	胡麻葉枯病	1,300	21	1.0	
33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3		400	20	0.5	
14%嘉賜克枯爛可濕性粉劑⑤	FRAC 24, D3 FRAC34,un03	白葉枯病	1,500	14	嘉賜黴素 0.2 克枯爛 0.2	本藥劑混合賓克隆、三賽唑等農藥，易發生藥害。不可與強酸或強鹼性藥劑混合使用。
33%克枯三賽唑可濕性粉⑤	FRAC34,un03 FRAC16.1, I1	白葉枯病	1,000	35	克枯爛 0.2 三賽唑 3.0	本藥劑混合賓克隆等農藥，可能發生藥害。
10%克枯爛可濕性粉劑⑤	FRAC34,un03	白葉枯病	1,000	15	0.2	本藥劑可能發生藥害，宜單劑使用，不得混合賓克隆、三賽唑等任一種農藥。
10%鏈四環黴素水溶性粉劑⑤	FRAC 25, D4 FRAC 41, D5		1,000	-	鏈黴素 免訂 四環黴素 免訂	病害發生初期開始施藥
6%撲殺熱粒劑⑤	FRAC P, P2	白葉枯病	30kg/ 公頃	-	0.5	幼穗形成期前施藥一次、施藥時田內應保持水深 3~5 公分，維持 4~5 天。
1*10 ⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	FRAC BM02	白葉枯病	600	-	-	病害發生初期開始施藥，每次間隔 7 天，連續施用 3 次
2%嘉賜黴素溶液⑤	FRAC 24, D3	細菌性穀枯病	250	14	0.2	

1*10 ⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	FRAC BM02	細菌性條斑病	600			病害發生初期施藥
0.3%芬普尼粒劑⑤	IRAC 2B	水稻線蟲 (白尖病)	50g/ 育苗箱	-	0.01	
10%芬滅松乳劑⑤	IRAC 1B		60g/ 育苗箱	-	0.01	預浸 24 小時後,再浸藥處理 2 小時。
10%毆殺滅溶液⑤	IRAC 1A	水稻線蟲 (白尖病)	450	-	0.02	稻種預浸 24 小時後,再浸藥處理 2 小時。
5%毆殺滅粒劑⑤	IRAC 1A	水稻線蟲 (白尖病)	120g/ 育苗箱	-	0.02	1.秧苗綠化期均勻撒布。2.不可施用於本田。3.施藥時必須戴手套

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植

物組織。☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



水稻病害防治用藥摘要表-無人飛行載具(Unmanned Aerial Vehicles, UAV)專用

*無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站 <https://uav.aphia.gov.tw/mp-1.html>

高雄區農業改良場 1130102 修訂

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	施藥方法及注意事項
50%護粒松乳劑	FRAC 6, F2	葉稻熱病	20	21	0.1	*插秧後 30 天至 45 天葉稻熱病初發生時施藥一次，7 至 10 天再施藥一次。1.適用於無人飛行載具。2.藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。
75%三賽唑可溼性粉劑	FRAC16.1, I1	葉稻熱病	60	25	3.0	*插秧後 30 天至 45 天葉稻熱病初發生時施藥一次，7 至 10 天再施藥一次。1.適用於無人飛行載具。2.藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。

2%嘉賜黴素溶液⑤	FRAC 24, D3	葉稻熱病	20	14	0.2	*插秧後 30 天至 45 天葉稻熱病初發生時施藥一次，7 至 10 天再施藥一次。1.適用於無人飛行載具。2.藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。
48%丙基喜樂松乳劑⑤	FRAC 6, F2	葉稻熱病	20		0.2	*插秧後 30 天至 45 天葉稻熱病初發生時施藥一次，7 至 10 天再施藥一次。1.適用於無人飛行載具。2.藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。
40%亞賜圃乳劑⑤	FRAC 6, F2	葉稻熱病	20	14	2.0	*插秧後 30 天至 45 天葉稻熱病初發生時施藥一次，7 至 10 天再施藥一次。1.適用於無人飛行載具。2.藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。

50%護粒松乳劑	FRAC 6, F2	穗稻熱病	16.7	21	0.1	*抽穗前 5-7 天及齊穗期各施藥一次。1.適用於無人飛行載具。 2.藥滴體積中值粒徑（VMD， Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。
75%三賽唑可溼性粉劑	FRAC16.1, I1	穗稻熱病	50	25	3.0	*抽穗前 5-7 天及齊穗期各施藥一次。1.適用於無人飛行載具。 2.藥滴體積中值粒徑（VMD， Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。
2%嘉賜黴素溶液⑤	FRAC24, D3	穗稻熱病	16.7	14	0.2	*抽穗前 5-7 天及齊穗期各施藥一次。1.適用於無人飛行載具。 2.藥滴體積中值粒徑（VMD， Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。

48%丙基喜樂松乳劑⑤	FRAC 6, F2	穗稻熱病	16.7		0.2	*抽穗前 5-7 天及齊穗期各施藥一次。1.適用於無人飛行載具。 2.藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。
40%亞賜圃乳劑⑤	FRAC 6, F2	穗稻熱病	16.7	14	2.0	*插秧後 30 天至 45 天葉稻熱病初發生時施藥一次，7 至 10 天再施藥一次。1.適用於無人飛行載具。 2.藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米，且植株上藥滴覆蓋率須達每平方公分 50 滴以上。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。 4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。
2.7%平速爛水分散性油懸劑⑤	HRAC 2	雜草	加水稀釋至 20 公升		0.02	1.防除移植本田雜草，草長至 2-4 葉時，均勻噴施於雜草植株上。2.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。3.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。4.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。5.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。

10%百速隆水懸劑⑤	HRAC 2	雜草	加水稀 釋至 20 公升		0.5	1.防除移植本田雜草。保持積水 3-7 天，水深 3-5 公分。3.1 期作插秧後 6-15 天，2 期作插秧後 3-10 天雜草長至 4 葉時施藥，均勻噴施於田面。2.適用於無人飛行載具，藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米。3.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。4.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。5.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。6.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站
44.1%本達隆溶液	HRAC 6	雜草	加水稀 釋至 20 公升		0.5	1. 適用於無人飛行載具，藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米。2.插秧後 20 ～ 40 日，田面雜草長至 10 公分時施藥。3.施藥前 1 日排乾積水後均勻噴施於雜草植株上，施藥後 2 ～ 5 天始可灌水。防治水稻移植本田雜草。4.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。5.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。6.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。7.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站
32 %丁基拉草乳劑⑤	HRAC 15	雜草	加水稀 釋至 20 公升		0.5	1.防治水稻移植本田雜草 2.插秧後 2 ～4 日，田面雜草之生長為萌芽至 1 葉時施藥。3.適用於無人飛行載具，藥滴體積中值粒徑（VMD，Volume Media Diameter）應大於 145 微米。4.風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。5.為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。6.操作者應站於上風處，並保持適當操作距離。7.無人飛行載具飛行參數請參閱防檢署農藥資訊服務相關網站。

◎農友施藥請遵守安全採收期

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。

*⑤ 系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準

