

牛蒡病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1130102 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採 收期(天)	安全容許 量(PPM)	備 註
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11,C3	露菌病	2,000	7	0.1	
18.7%達滅克敏水分散性粒劑	FRAC 11,40	露菌病	1,500	7	百克敏 0.4 達滅芬 0.05	病害發生初期開始施藥
1 x 10 ⁹ CFU/G液化澱粉芽孢 桿菌QST713水懸劑	FRAC BM02	露菌病	400	免訂	免訂	病害發生初期開始施藥
11.76%芬瑞莫乳劑⑤	FRAC 3,G1	白絹病	4,000	21	0.02	
5%三泰芬可濕性粉劑⑤	FRAC 3,G1	白絹病	2,000	3	0.1	
30%賽福座可濕性粉劑⑤	FRAC 3,G1	白絹病	3,000	18	0.5	
99%礦物油乳劑	FRAC NC	白絹病	500	免訂	免訂	
50%撲滅寧可濕性粉劑⑤	FRAC 2,E3	白絹病	2,000	12	0.5	
50%福多寧可濕性粉劑⑤	FRAC 7,C2	白絹病	3,000	18	1.0	
24.9%待克利水懸劑⑤	FRAC 3,G1	炭疽病	3,000	21	0.3	
250g/L 待克利乳劑⑤	FRAC 3,G1	炭疽病	3,000	21	0.3	
40%四氯異苯腈水懸劑	FRAC M5	炭疽病	320	14	0.5	不可與石灰硫磺劑混合使用
23.6%百克敏水懸劑	FRAC 11,C3	炭疽病	3,000	7	0.4	
50%氟殺克敏水懸劑	FRAC 11 ,7	炭疽病	2,500	7	百克敏 0.4 氟克殺 0.03	病害發生初期開始施藥
27.3%三氟得克利水懸劑⑤	FRAC11,C3 FRAC 3,G1	炭疽病	2,500	21	三氟敏 0.1 得克利 0.4	
500g/L 達滅芬水懸劑	FRAC 40	疫病	3,000	7	0.05	

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

72%鋅錳克絕可濕性粉劑	FRAC M3 FRAC 27	疫病	500	21	二硫代 0.5 克絕 0.1	
9.4%賽座滅水懸劑	FRAC 21	疫病	3,000	14	0.1	
250g/L 曼普胺水懸劑	FRAC 40	疫病	2,500	15	0.01	病害發生初期開始施藥。具魚毒性
39.5%普拔克溶液⑤	FRAC 28	幼苗 疫病	250	21	0.3	病害發生時灌藥 1 次，1-4ml/株。
300g/L 氟克殺水懸劑	FRAC 7,C2	黑斑病	5,000	14	0.03	
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7,C2 FRAC 11,C3	黑斑病	3,000	14	白克列 0.5 百克敏 0.4	病害發生初期開始施藥
5×10 ⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可溼性粉劑	FRAC BM02	黑斑病	600	-	-	病害發生初期開始施藥 藥液需均勻噴施於植株全株
500g/L 氟殺克敏水懸劑	FRAC 7,C2 FRAC 11,C3	白粉病	5,000	7	氟克殺 0.03 百克敏 0.4	
95%礦物油乳劑	FRAC NC	白粉病	500	免訂	免訂	
20%維利黴素溶液	FRAC 26	細菌性 斑點病	1,200	免訂	免訂	
1×10 ⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	FRAC BM02	灰黴病	600	免訂	免訂	病害發生初期開始施藥
1x10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑	FRAC BM02	萎凋病	250	免訂	免訂	種子直播或幼苗定植後，10-14 天開始施用，以每株 250 毫升藥液量於植株莖基部或根圈進行土壤澆灌。 應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。
5%克福隆乳劑	IRAC 15	夜蛾類 毒蛾類	2,000	3	0.2	
20%芬化利水基乳劑	IRAC 3A	夜蛾類 毒蛾類	3,000	14	0.1	對蜜蜂有毒性
2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	IRAC 3A	夜蛾類 毒蛾類	2,000	9	0.04	對蜜蜂具毒性，避免花期使用。
75%硫敵克可濕性粉劑	IRAC 1A	夜蛾類 毒蛾類	2,500	6	0.5	

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

18.4%剋安勃水懸劑	IRAC 28	夜蛾類 毒蛾類	2,500	14	0.02	
25%二福隆可濕性粉劑	IRAC 15	夜蛾類 毒蛾類	1,500	35	1.0	對蜜蜂具毒性，避免花期使用。
58%乃力松乳劑	IRAC 1B	夜蛾類 毒蛾類	1,000	4	0.2	對水中生物有劇毒性，禁止施用於水域
5%因滅汀水溶性粒劑	IRAC 6	夜蛾類 毒蛾類	5,000	9	未訂	對蜜蜂具毒性，避免花期使用。
19.2g/L因滅汀乳劑	IRAC 6	夜蛾類 毒蛾類	2,000	9	未定	同上
5%賽滅寧水基乳劑	IRAC 3A	夜蛾類 毒蛾類	1,500	6	0.01	對蜜蜂有劇毒性，避免花期使用。
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	夜蛾類 毒蛾類	1,000	3	0.05	同上
50%培丹水溶性粉劑⑤	IRAC 14	夜蛾類 毒蛾類	1,000	10	0.1	高溫下施用易引起幼苗藥害。 對蜜蜂有劇毒性
5%可芬諾水懸劑	IRAC 18	夜蛾類 毒蛾類	1,000	18	0.05	
40%納乃得水溶性粒劑⑤	IRAC 1A	夜蛾類 毒蛾類	1,600	6	1.0	
54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	FRACBM02 IRAC 11A	鱗翅目 害蟲	1,000			蔬菜
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	2,000	6	0.05	對蜜蜂有劇毒性，避免花期使用
18.2%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	8,000	6	0.5	同上
21.8%速殺氟水懸劑	IRAC 4C	蚜蟲類	6,000	6	0.03	對蜜蜂有劇毒性，避免花期使用
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,000	6	0.05	對蜜蜂有輕等毒性

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

25%免扶克可濕性粉劑⑤	IRAC 1A	蚜蟲類	700	12	未訂	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
25%賽速安水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	5,000	14	0.25	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
25%馬拉松可濕性粉劑	IRAC 1B	蚜蟲類	750	7	0.5	
100g/L 賜派滅水懸劑⑤	IRAC 23	粉蝨類	1,000	14	0.8	
9.6%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	粉蝨類	1,500	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性，避免花期使用
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	潛蠅類	2,000	9	0.04	對蜜蜂有劇毒性，避免花期使用
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	潛蠅類	2,000	9	0.04	同上
2%阿巴汀乳劑	IRAC 6	潛蠅類	1,000	3	0.01	同上
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	潛蠅類	1,000	7-15	0.05	對蜜蜂有輕等毒性
9.6%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	1,500	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性，避免花期使用
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	薊馬類	1,000	3	0.05	同上
11.7%賜諾殺水懸劑	IRAC 5	薊馬類	8,000	6	0.02	對蜜蜂毒性高。對水生生物具中等毒性。勿使用於「飲用水水質水源保護區」。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	薊馬類	2,000	9	0.04	對蜜蜂具毒性，避免花期使用。
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	6	0.5	對蜜蜂有中等毒性
18.2%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性，避免花期使用。
10%百滅寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	14	0.5	
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5	薊馬類	8,000	6	0.02	
40%納乃得水溶性粒劑⑤	IRAC 1A	薊馬類	1,600	6	1.0	
20%畢達本水懸劑	IRAC 21A	葉蝸類	3,000	7	未訂	

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。要選擇不同作用機制的農藥輪替使用。

*⑤ 系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。