

豆菜類病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1130125 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	防治病 蟲害	稀釋 倍數	安全採 收期	安全容許量 (PPM)	備 註
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,000	3	1.0	禁止使用於豆苗。對蜜蜂有劇毒性。
10%福瑞松粒劑	IRAC 1B	蚜蟲類	10 公斤 /公頃	限種植前 使用	0.05	
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,000	7	0.2	對蜜蜂有輕等毒性
10%氟尼胺水分散性粒劑	IRAC 29	蚜蟲類	4,000	7	2.0	適用於鮮豆
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	薊馬類	1,000	18	0.5	對蜜蜂有劇毒性
25%福化利乳劑	IRAC 3A	薊馬類	3,000	7	0.5	具強烈眼睛刺激性
2.9%貝他-賽扶寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,500	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性
11.6%賜諾殺水懸劑	IRAC 5	薊馬類	4,500	3	0.3	對蜜蜂毒性高。
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC-5	薊馬類	8,000	7	0.05	害蟲發生時開始施藥
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	薊馬類	800	10	1.0	對蜜蜂具微毒性。限結莢前使用。避免與石灰硫磺劑混合使用。
20%亞滅培水溶性粉劑 ^⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	6	1.0	對蜜蜂有中等毒性
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	3	1.0	禁止使用於豆苗。 對蜜蜂有劇毒性
18.2%益達胺溶液 ^⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	9	3.0	對蜜蜂有劇毒性

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

10%百滅寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	4	1.0	毛豆除外。適用於鮮豆。
100g/L 賜派滅水懸劑	IRAC 23	薊馬類	1,000	7	1.5	對蜜蜂有毒性
20%達特南水溶性粒劑Ⓢ	IRAC 4A	粉蝨類	3,000	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性
28.8%益達胺溶液Ⓢ	IRAC 4A	粉蝨類	4,500	21	0.5	對蜜蜂有劇毒性
9.6%益達胺溶液Ⓢ	IRAC 4A	粉蝨類	1,500	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性
25%派滅淨可濕性粉劑	IRAC 9B	粉蝨類	2,000	21	0.5	具中等呼吸急毒性 禁止使用於豆苗
100g/L 賜派滅水懸劑	IRAC 23	粉蝨類	1,000	7	1.5	對蜜蜂有毒性
16%可尼丁水溶性粒劑Ⓢ	IRAC 4A	粉蝨類	3,000	6	0.02	對蜜蜂有劇毒性
11%百利普芬水基乳劑	IRAC 7C	粉蝨類	1,000	14	0.2	適用於鮮豆
20%畢達本可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蟎類	3,000	14	0.4	對蜜蜂毒性高。
25%新殺蟎乳劑	IRAC UN	細蟎類	500	14	1.0	禁止使用於毛豆。
50%馬拉松乳劑	IRAC 1B	蝶蛾類	500	4	2.0	幼苗對馬拉松較敏感。不可與鹼性藥劑混用、溫室栽培避免使用。
50%加保利可濕性粉劑Ⓢ (菜豆)	IRAC 1A	蝶蛾類	1,000	7	0.5	
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	蝶蛾類	2,000	3	1.0	豆莢採收前3天停止施藥、豆苗採收前9天停止施藥。對蜜蜂有劇毒性。
40%賽速安勃水分散性粒劑Ⓢ	IRAC 4A IRAC-28	蝶蛾類	5,000	6	賽速安 0.02 剋安勃 1.0	對蜜蜂有劇毒性 其他豆菜類(刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶豆、鸚嘴豆除外)，賽速安殘留量為 0.01ppm
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	蝶蛾類	1,000	18	0.5	對蜜蜂有劇毒性

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

5%因滅汀乳劑	IRAC 6	蝶蛾類	5,000	3	0.02	對蜜蜂有劇毒性 其他豆菜類(刀豆、毛豆、花豆、扁豆、豇豆、菜豆、豌豆、樹豆、翼豆、蠶豆、鷹嘴豆除外)0.01ppm
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	蝶蛾類	800	10	1.0	對蜜蜂具微毒性。 限結莢前使用。 3.避免與石灰硫磺劑混合使用。
10%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC 3A	蝶蛾類	3,000	9	0.5	對蜜蜂有毒性
18.4%剋安勃水懸劑	IRAC 28	蝶蛾類	2,500	6	1.0	具中等呼吸急毒性
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5	蝶蛾類	1,200	7	菜豆 0.2 其他 0.05	避免開花期使用
20%芬化利水基乳劑	IRAC 3A	蝶蛾類	3,000	14	0.1	對蜜蜂有毒性
34%硫敵克水懸劑	IRAC 1A	蝶蛾類	1,000	14	1.0	具魚毒性
25%二福隆可濕性粉劑	IRAC 15	蝶蛾類	1,500	21	1.0	對蜜蜂具毒性，避免開花期使用。
33%佈飛百滅寧乳劑	IRAC 1B IRAC 3A	蝶蛾類	1,000	10	佈飛松 1.0 百滅寧 1.0	對水中生物有劇毒性
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	蝶蛾類	1,000	3	1.0	禁止使用於豆苗。 對蜜蜂有劇毒性。
54%鮎澤蘇力菌水分散性粒劑	IRAC 11A	蝶蛾類	1,000	免訂	免訂	
58%乃力松乳劑	IRAC 1B	蝶蛾類	1,000	4	0.5	
40%納乃得水溶性粒劑⑤	IRAC 1A	蝶蛾類	1,500	7	0.5	對蜜蜂有劇毒性
2%阿巴汀乳劑	IRAC 6	蝶蛾類	2,000	7	0.08	對蜜蜂有劇毒性。適用於鮮豆。
4.4%祿芬隆乳劑	IRAC 15	蝶蛾類	1,500	14	1.0	
甜菜夜蛾核多角體病毒水懸劑	非農藥資材	甜菜夜蛾	3,000	免訂	免訂	

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

54%鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	FRACBM02 IRAC 11A	鱗翅目 害蟲	1,000		免訂	蔬菜 害蟲發生時開始施藥
48.1%鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性粒劑	FRACBM02 IRAC 11A		1,000		免訂	害蟲發生時開始施藥
4.4%祿芬隆乳劑(豌豆)	IRAC 15	鱗翅目 害蟲	1,500	7	1.0	對蜜蜂有毒性 適用於葉用豌豆
10%福瑞松粒劑⑤	IRAC 1B	潛蠅類	10 公斤 /公頃	種植前 使用	0.05	
8.9%賽滅淨溶液⑤	IRAC 17	潛蠅類	1,000	7	1.0	具眼睛刺激性
0.5%可尼丁粒劑⑤	IRAC-4A	潛蠅類	60kg/ 公頃	定植後 施用	0.02	定植後於畦上施藥 1 次，並灌水至畦面濕潤。
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	潛蠅類	1,000	7-15	1.0	對蜜蜂有輕等毒性
50%馬拉松乳劑	IRAC 1B	瓜實蠅	800	7	2.0	具魚毒性。開花結果後施藥。
33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3	銹病	400	12	豆菜 2.5	1.高溫多溼下易藥害。2.避免與石灰硫磺合劑混合使用。
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7 FRAC 11	銹病	1,500	9	白克列 1.0 百克敏 0.5	禁止使用於豆苗。
30%三得寧乳劑⑤(菜豆)	FRAC 5 FRAC 3	銹病	1,000	4	三得芬 1.0 賽福寧 0.5	
75%嘉保信可濕性粉劑⑤	FRAC 7	銹病	1,500	6	5.0	
43.7%三氟敏水懸劑	FRAC 11,C3	銹病	3,000	7	0.5	適用於鮮豆。病害發生初期開始施藥，施用 2 次。對水中生物有劇毒性。
38%白列克敏水分散性粒劑 (菜豆)	FRAC 7 FRAC 11	銹病	1,500	9	白克列 1.0 百克敏 0.5	適用於鮮豆

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

50%脫克松可濕性粉劑(豌豆)	FRAC 14	立枯病	0.5 公 克/公 斤種子	限拌種時 施用	未訂	限豌豆拌種時施用。
24.9%待克利水懸劑⑤	FRAC 3	角斑病	3,000	3	1.0	對水中生物有劇毒性
23%三泰隆水分散性乳劑⑤	FRAC 3	煤黴病	3,000	3	2.0	苗期禁止使用。
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑⑤	FRAC 9 FRAC 12	灰黴病	2,000	14	賽普洛 0.5 護汰寧 0.3	禁用毛豆。 採收前14天停止施藥
37.4%派美尼水懸劑	FRAC 9	灰黴病	1,500	14	1.0	具中等呼吸急毒性
500g/L 氟殺克敏水懸劑	FRAC 7 FRAC 11	灰黴病	5,000	21	氟克殺 2.0 百克敏 0.5	具中等口服急毒性 具魚毒性
42.4%白克列水懸劑	FRAC 7	灰黴病	1,200	9	1.0	具中等呼吸急毒性
1*10 ⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	FRAC BM02	灰黴病	600		免訂	病害發生初期開始施用
20%平硫瑞水懸劑	FRAC 7	灰黴病	2,00	3	3.0	病害發生初期開始施用
50%撲滅寧可濕性粉劑⑤	FRAC E3	白絹病	2,000	14	2.0	禁止使用於豆苗與乾豆 定植後每株灌注200ml，15天後再灌注1次
50%福多寧可濕性粉劑⑤	FRAC 7	白絹病	3,000	14	1.0	
5%三泰隆可濕性粉劑⑤	FRAC 3	白粉病	2,000	3	2.0	豌豆苗採收前 6 天停止使用。
13.4%邁克尼乳劑	FRAC 3	白粉病	4,000	7	0.1	適用於鮮豆
10.5%平克座乳劑⑤	FRAC 3	白粉病	4,000	6	0.5	
84.2%三得芬乳劑⑤	FRAC 5	白粉病	3,500	9	1.0	
50%白克列水分散性粒劑	FRAC 7	白粉病	2,500	9	1.0	禁止用於豆苗。
50%撲滅寧水懸劑⑤	FRAC 2	白粉病	1200	14	2.0	扁豆、翼豆及刀豆，限結莢前使用。 菜豆、碗豆、花豆、樹豆、豇豆、蠶豆及菜豆， 適用於鮮豆。

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

24.9%待克利水懸劑⑤	FRAC 3	白粉病	3,000	3	1.0	對水中生物有劇毒性
99%礦物油乳劑	FRAC NC	白粉病	500	免訂	免訂	
50% 1*10 ⁹ CFU/G 枯草桿菌 Y1336 可濕性粉劑	FRAC 44	白粉病	800	免訂	免訂	陰天或傍晚施用。避免與銅劑或抗生素混合使用。
80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	FRAC NC	白粉病	1,000	免訂	免訂	
500g/L 氟殺克敏水懸劑	FRAC 7 FRAC 11	白粉病	5,000	21	氟克殺 2.0 百克敏 0.5	
13.4%邁尼克乳劑	FRAC 3	白粉病	4,000	7	0.5	適用於鮮豆
10.5%平克座乳劑⑤	FRAC 3	白粉病	4,000	6	0.5	
22.58%快諾芬水懸劑	FRAC13,E1	白粉病	4,000	2	1.0	適用於鮮豆
48%松香酯銅乳劑	FRAC M1	露菌病	1,000	免訂	免訂	
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11	露菌病	2,000	14	0.5	具中等呼吸急毒性、中等眼睛刺激性
50%達滅芬水懸劑	FRAC 40	露菌病	3,000	6	2.0	具中等口服及眼睛急毒性
23.6%百克敏水懸劑	FRAC 11	炭疽病	3,000	7	0.5	具中等口服及呼吸急毒性、中等皮膚及眼睛刺激性。對水中生物有劇毒性。
325g/L 亞托待克利水懸劑⑤	FRAC 11 FRAC 3	炭疽病	2,000	7	亞托敏 0.5 待克利 1.0	限結莢前使用
24.9%待克利水懸劑⑤	FRAC 3	炭疽病	3,000	3	1.0	對水中生物有劇毒性
40%四氯異苯腈水懸劑	FRAC M5	炭疽病	300	6	5.0	不可與石灰硫磺劑混合使用。適用於鮮豆
27.3%三氟得克利水懸劑⑤	FRAC11,C3 FRAC 3,G1	炭疽病	2,500	7	三氟敏 0.05 得克利 1.0	適用於乾豆
63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑	FRAC M1	疫病	400	免訂	免訂	避免與石灰硫磺或礦物油混合使用
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11	疫病	2,000	14	0.5	具中等呼吸急毒性、中等眼睛刺激性

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

35%依得利可濕性粉劑	FRAC 14	幼苗疫病	3,000	未訂	0.5	播種當日及 10 或 15 天後灌藥一次。濃度提高時易發生藥害。 禁止使用於豆苗與乾豆類。
25%依得利乳劑	FRAC 14	幼苗疫病	1,500	未訂	0.5	同上
39.5%普拔克溶液⑤	FRAC 28		150	6	0.1	限苗期使用。 與液肥或植物生長調節劑混合使用，可能引起植株生長異常。適用於鮮豆。適用於葉用豌豆，以澆水器均勻淋灌於苗床土壤。
300g/L 氟克殺水懸劑	FRAC 7,C2	黑斑病	5,000	7	2.0	
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7 FRAC 11	黑斑病	3,000	9	白克列 1.0 百克敏 0.5	適用於鮮豆。具中等口服及呼吸急毒性。對水中生物有劇毒性。
23%三元硫酸銅水懸劑(菜豆)	FRAC M1	葉部細菌性病害	500	-	免訂	病害發生初期開始施藥。具魚毒性
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	葉部細菌性病害	500	-	免訂	病害發生初期開始施藥。具魚毒性。
20%維利黴素溶液	FRAC 26	葉燒病	1,200		免訂	延伸使用
5x10 ⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可溼粉粉劑	FRAC BM02	葉斑病 葉枯病 褐斑病	600	-	免訂	病害發生初期開始施藥。藥液需均勻噴施於植株全株。
1x10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑	FRAC BM02	萎凋病	250	-	免訂	菜豆 種子直播或定植後，待長出 3-4 片葉子完全展開後進行施用。 豆菜類 種子直播或幼苗定植後，10-14 天開始施用，以每株 250 毫升藥液量於植株莖基部或根圍進行土壤澆灌。應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用
0.5%開寧激素溶液	植物生長調節劑	菜豆促進開花	1,000	未訂	未訂	限菜豆促進開花用、始花期均勻噴施於全株。

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。要選擇不同作用機制的農藥輪替使用。

*㊟系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

☆登記藥劑仍以防檢局公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。