



第 113010 號

新聞資料

農業部高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

中華民國 113 年 2 月 5 日

濕冷天氣將至 加強作物病害防治

依據中央氣象署天氣預報，近日受鋒面通過及東北季風影響，南部地區有零星降雨機率，2月7日起大陸冷氣團逐漸南下，且華南雲雨區東移，各地皆有短暫雨情形，天氣屬濕冷型態。由於洋蔥將陸續進入結球期，而蓮霧、棗及番茄等作物正值採收階段，因此，高雄區農業改良場（以下簡稱高雄農改場）籲請農友多加留意病害防治，以免病害蔓延造成損失。

高雄農改場戴順發場長指出，洋蔥炭疽病等重要病害，好發在潮濕多雨環境，炭疽病菌可感染葉片並造成褐色圓形或長橢圓形乾枯斑塊，甚至造成葉片褐化萎凋及葉鞘彎曲症狀。蓮霧果實病害於環境濕度偏高時，發生風險隨之提高，病原菌可殘存在枯枝落葉，若套袋袋口包覆不完全，雨水會順著果柄滲入套袋內引發果實病害。連日陰雨亦利於棗疫病(俗稱水傷)的發生，受感染的果表出現水浸狀圓斑，濕度高時，果實表面會長出白色黴狀物。此外，番茄晚疫病好發在低溫、高濕的環境，植株莖部染病則會呈現水浸狀黑褐化，農友俗稱「黑骨」，嚴重時全株焦枯、死亡。

戴場長強調，各項病害防治工作，首重落實田間衛生管理，應及時移除發病植株，以減少感染源，並可搭配核准用藥進行防治。防治洋蔥炭疽病可選用75%四氯異苯腈可溼性粉劑600倍或24.9%待克利水懸劑3,000倍。蓮霧、棗及番茄因正值採收期，使用化學防治時，應搭配採收計畫，嚴格遵守藥劑安全採收期，或使用免訂殘留容許量藥劑，如27.12%三元硫酸銅；疫病及晚疫病的預防，則可在病害發生前可預先施用「亞磷酸」混合等量的「氫氧化鉀」，或設法減少土棲病原菌因雨水飛濺接觸果實機會，如避免結果位置過低，以及覆蓋雜草抑制蓆可有效阻隔雨水飛濺傳播病害。農友如有病害診斷、防治或用藥上的問題，可直接與高雄農改場聯繫(08-7389060)，技術人員將竭誠提供協助。

- 農藥資訊服務<https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Pesticide>
- 植物保護資訊系統 <https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/>
- 高雄農改場作物安全用藥資訊 <https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665>

聯絡人：陳正恩 副研究員

電話：08-7746760



洋蔥炭疽病在感染葉片上造成乾枯斑塊



應落實田間衛生以減少感染源



梨果實受疫病為害出現褐色水浸狀斑點



番茄晚疫病造成植株焦枯