

百香果病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1130401 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收 期(天)	安全容許量 (PPM)	備 註
325g/L亞托待克利水懸劑⑤	FRAC 11,C3 FRAC 3, G1	炭疽病	3,000	21	亞托敏 1.0 待克利 0.5	具中等呼吸急毒性
70%甲基多保淨可濕性粉劑⑤	FRAC 1,B1	炭疽病	1,000	6	1.0	具強烈呼吸急毒性
23.6%百克敏水懸劑	FRAC 11,C3	炭疽病	3,000	12	0.5	開花初期施藥
40%克熱淨(烷苯磺酸鹽)可濕性粉劑	FRAC M7	炭疽病	1,500	21	0.3	
25.9%得克利水基乳劑⑤	FRAC 3, G1	炭疽病	1,500	6	0.5	
80%免得爛水分散性粒劑	FRAC M3	炭疽病	500	21	2.5	
43.7%三氟敏水懸劑	FRAC 11,C3	炭疽病	4,000	18	0.5	開花初期施藥
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑⑤	FRAC 9, D1 FRAC 12,E2	炭疽病	2,000	12	賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	開花初期施藥。具中等呼吸急毒性。對水中生物有劇毒性及具魚毒性。
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11,C3	炭疽病	2,000	12	1.0	具中等呼吸急毒性及具中等眼睛刺激性。對水中生物有毒性。
500g/L 三氟派瑞水懸劑	FRAC 11,C3 FRAC 7	炭疽病	4,000	18	三氟敏 0.5 氟派瑞 0.8	
39.5%扶吉胺水懸劑	FRAC 29	炭疽病	2,000	9	0.5	
貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑 1x10 ⁹ CFU/G	FRAC BM02	炭疽病	600	免訂	免訂	病害發生初期開始施藥

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

1x10 ⁹ CFU/G 枯草桿菌 KHY8 水懸劑	FRAC BM02	炭疽病	500	免訂	免訂	自開花初期開始施用，每 7-10 天使用 1 次，至果實採收為止。
純白鏈黴菌素 700PCU/g 水溶性粉劑	FRAC BM02	疫病	800	免訂	免訂	
60.8%氟比拔克水懸劑⑤	FRAC 43, B5 FRAC 28, F4	疫病	1,000	14	氟比來 2.0 普拔克 10.0	具中等呼吸急毒性 具魚毒性
52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	FRAC 11,C3 FRAC 27,un01	疫病	1,500	12	凡殺同 0.02 克 絕 1.0	具中等眼睛刺激性 具輕等皮膚刺激性 對水中生物有劇毒性 具魚毒性
76.5%銅減達樂可濕性粉劑	FRAC M1 FRAC 4, A1	疫病	1,000	12	鹼性氯氧化銅 免訂 減達樂 0.5	
71.6%銅右減達樂可濕性粉劑	FRAC M1 FRAC 4, A1	疫病	1,000	12	鹼性氯氧化銅 免訂 減達樂 0.5	
80%福賽得水分散性粒劑	FRAC 33	疫病	500	21	20	雨季來臨前開始施藥，共 3 次
27.120%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	疫病	800	免訂	免訂	具魚毒性
9.4%賽座滅水懸劑	FRAC 21	疫病	2,000	12	0.5	雨季來臨前開始施藥。具中等呼吸急毒性。對水中生物有劇毒性、具魚毒性。
18.7%達滅克敏水分散性粒劑	FRAC 11,40	疫病	1,000	12	達滅芬 1.0 百克敏 0.5	雨季來臨前開始施藥
81.3%嘉賜銅可濕性粉劑	FRAC 24/M1	疫病	1,000	6	嘉賜黴素 0.5	雨季來臨前開始施藥 具強烈眼睛刺激性及強烈皮膚刺激性。具魚毒性。

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

10%賜派滅水懸劑	IRAC 23	粉蝨類	1,500	10	0.1	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用 具中等呼吸急毒性 具中等皮膚過敏性 具魚毒性
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5	薊馬類	3,200	12	0.2	具中等呼吸急毒性。對蜜蜂有劇毒性。
5.87%賜諾特水懸劑	IRAC 5	薊馬類	1,600	12	0.2	具中等呼吸急毒性。對蜜蜂有劇毒性。
37%第滅達胺水懸劑⑤	IRAC 3A IRAC 4A	薊馬類	2,000	12	第滅寧 0.2 益達胺 0.5	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
0.05%可尼丁粒劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	3,000	10	0.2	對蜜蜂有劇毒性、具高魚毒性
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	7	1.0	對蜜蜂有中等毒性
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	3,000	10	1.0	對蜜蜂有劇毒性。具中等呼吸急毒性、具輕等皮膚刺激性及具輕等眼睛刺激性。
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5	蝶蛾類	2,000	12	0.2	對蜜蜂有劇毒性。具中等呼吸急毒性。
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	蝶蛾類	1,500	12	0.2	對蜜蜂有輕等毒性
2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	蝶蛾類	1,500	12	0.2	同上
2.8%賽洛寧水懸劑	IRAC 3A	蝶蛾類	2,000	9	1.0	具強烈皮膚刺激性、具中等眼睛刺激性、具中等呼吸急毒性 具中等口服急毒性、具中等皮膚過敏性。對水中生物有劇毒性。對蜜蜂有劇毒性。

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	蝶蛾類	2,000	9	1.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用 具中等眼睛刺激性、具中等口 服急毒性、具中等呼吸急毒性 、具強烈皮膚刺激性、具中等 皮膚過敏性。對水中生物有劇 毒性，具魚毒性。
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	蝶蛾類	1,000	12	0.5	具中等呼吸急毒性、具中等口 服急毒性、具中等皮膚急毒性 及具中等皮膚刺激性。對水中 生物有劇毒性及魚毒性。具高 鳥類毒性。對蜜蜂有劇毒性。
40%撲滅松可濕性粉劑	IRAC 1B	粉介殼蟲類	2,000	10	0.5	避免施用於弱勢植株，以免發 生藥害
50%芬殺松乳劑	IRAC 1B	粉介殼蟲類	1,000	6	1.0	具中等口服急毒性、中等皮膚 急毒性、具輕等皮膚刺激性及 輕等眼睛刺激性。對水中生物 有劇毒性，具魚毒性
24.7%賽速洛寧膠囊水懸混 劑⑤	IRAC 4A IRAC 3A	粉介殼蟲類	4,000	9	賽速安 1.0 賽洛寧 1.0	對蜜蜂有劇毒性。對水中生物 有劇毒性。具強烈皮膚刺激 性、具中等眼睛刺激性、中等 口服急毒性及中等呼吸急毒 性。
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	粉介殼蟲類	2,000	10	1.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用 具中等呼吸急毒性、具輕等皮 膚刺激性及具輕等眼睛刺激性
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	粉介殼蟲類	2,500	7	1.0	對蜜蜂有中等毒性

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

21.8%速殺氟水懸劑	IRAC 4C	粉介殼蟲類	3,000	14	0.5	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
11%百利普芬乳劑	IRAC 7C	粉介殼蟲類	1,500	7	0.2	秋冬季節、植株枝葉繁茂時期易發生
40%三落松乳劑	IRAC 1B	斑潛蠅類	1,000	14	0.5	
10%芬殺蟎乳劑	IRAC 21A	葉蟎類	1,500	12	0.5	具眼睛刺激性、具皮膚刺激性 對水中生物有劇毒性 對蜜蜂有中等毒性
15%亞酞蟎水懸劑	IRAC 20B	葉蟎類	1,500	14	1.0	
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	葉蟎類	1,000	12	0.5	具中等呼吸急毒性、具中等口服急毒性、具中等皮膚急毒性及具中等皮膚刺激性。對水中生物有劇毒性及魚毒性。具高鳥類毒性。對蜜蜂有劇毒性。
10%依殺蟎水懸劑	IRAC 10B	葉蟎類	3,500	3		具強烈呼吸急毒性、具中等皮膚急毒性。對水中生物有劇毒性及具魚毒性。
5%芬普蟎水懸劑	IRAC 21A	葉蟎類	2,000	14	0.1	具中等眼睛刺激性、具輕等皮膚刺激性。對水中生物有劇毒性，具高魚毒性。
240g/L 賜滅芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,000	7	1.0	害蟎發生時施藥 1 次 可能危害天敵。對水中生物有劇毒性，具魚毒性。
30%賽派芬水懸劑	IRAC 25A	葉蟎類	2500	7	0.1	害蟎發生時施藥 1 次
10%氟尼胺水分散性粒劑	TRAC 29	蚜蟲類	3,000	14	1.0	具中等呼吸急毒性、中等皮膚刺激性及強烈眼睛刺激性

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。