

咖啡病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1130401 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治病 蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容 許量(PPM)	備 註
23.6%百克敏乳劑	FRAC 11,C3	炭疽病	3,000	45	0.3	避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。
25.9%得克利水基乳劑⑤	FRAC 3,G1	炭疽病	1,500	30	0.1	
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11,C3	炭疽病	2,000	14	0.05	避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。
250g/L 亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11,C3	炭疽病	2,000	14	0.05	同上
貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑 1x10 ⁹ CFU/G	FRAC BM02	炭疽病	600	-	免訂	病害發生初期開始施藥
1x10 ⁹ CFU/mL 貝萊斯芽孢桿菌 BF 水懸劑	FRAC BM02	炭疽病	600			開花期或幼果期開始施藥。
95%礦物油乳劑	FRAC NC	軟介殼蟲類	200	免訂	免訂	
25%布芬淨可濕性粉劑	IRAC 16	介殼蟲類	1,000	7	0.1	害蟲發生時施藥 1 次
40%布芬淨水懸劑	IRAC 16	介殼蟲類	1,500	7	0.1	害蟲發生時施藥 1 次
16%可尼丁水溶性粒劑	IRAC 4A	粉介殼蟲類	1,500	28	0.05	避免開花期使用
2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	蝶蛾類	1,000	15	0.05	對蜜蜂有輕等毒性。禁止施用於水域。
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	東方果實蠅	1,500	15	0.05	同上

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。

*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。