

蜜棗病蟲害防治用藥摘要表

高雄區農業改良場 1041231 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容 許量(PPM)	日本安全容 許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
34.5%貝芬菲克利水懸劑	FRAC1, B1 FRAC3,G1	白粉病	4,000	6	貝芬替 1.5 菲克利 0.5	3.0 0.5	檬果炭疽病；梨黑星病。
50%白克列水分散性粒劑	FRAC7,C2	白粉病	2,500	21	2.5	10.0	瓜類及豆類白粉病；香蕉 黑星病。
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7,C2 FRAC 11,C3	白粉病	1,500	12	白克列 2.5 百克敏 1.0	10.0 0.02	菜豆銹病；香瓜蔓枯病； 蓮霧果腐病；木瓜炭疽病 。
50%三氟敏水分散性粒劑	FRAC 11,C3	白粉病	5,000	21	0.5	0.7	瓜類蔓枯病，蓮霧、番石 榴、楊桃、檬果炭疽病， 蓮霧果腐病，蔥銹病。
40%克熱淨（烷苯磺酸鹽）可濕性 粉劑	FRAC M7	白粉病	1,000	6	0.2	0.5	檬果及蓮霧炭疽病；番石 榴瘡痂病；洋香瓜白粉病 。
23%三泰隆水分散性乳劑	FRAC3, G1	白粉病	3,000	15	1.0	0.2	小葉菜類葉枯病、葉斑病 ；檬果及瓜果類白粉病。
40%邁克尼可濕性粉劑	FRAC3,G1	白粉病	6,000	6	0.5	1.0	1.兼防瓜類白粉病；柿角 斑病。 2.不得添加展著劑，避免 藥害。
37%護砂得乳劑	FRAC3,G1	白粉病	8,000	9	0.2	未訂	洋香瓜蔓枯病；葡萄白粉 病。
20.8%比芬諾乳劑	FRAC3,G1	白粉病	4,000	6	0.5	未訂	香蕉葉黑星病；葡萄白粉 病。
10.5%平克座乳劑	FRAC3,G1	白粉病	3,000	6	0.2	0.05	木瓜、豆菜類、瓜類、檬 果白粉病。
5%菲克利水懸劑	FRAC3,G1	白粉病	3,000	6	0.5	0.5	水稻紋枯病；蔥科蔬菜類 銹病；胡瓜白粉病。

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容 許量(PPM)	日本安全容 許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
35.15%銅合硫磺水懸劑	FRAC-M2, FRAC-M1	白粉病	600	6	未訂	未訂	葡萄白粉病。
30%賽福座可濕性粉劑	FRAC3,G1	白粉病	3,000	12	1.0	2.0	瓜菜類及牛蒡白粉病。
11.8%護汰芬水懸劑	FRAC3,G1	白粉病	2,000	6	0.4	未訂	兼防銹病。
5%三泰芬可濕性粉劑	FRAC3,G1	白粉病	1,500	5	0.5	0.2	經標示外使用公告核准 使用於梨果類白粉病(棗 為梨果類)。
25%布瑞莫乳劑	FRAC8,A2	白粉病	3,000	2	2.0	未訂	經標示外使用公告核准 使用於梨果類白粉病(棗 為梨果類)。
42.37%滅芬農水懸劑	FRAC U8	白粉病	4,000	14	未訂	未訂	
50%賽普洛水分散性粒劑	FRAC9,D1	白粉病	1,000	6	1.0	3.0	1.經標示外使用公告核 准使用於梨果類黑星病(棗為梨果類)。 2.兼防瓜類白粉病。
50%撲滅寧可溼性粉劑	FRAC2,E3	白粉病	1,500	6	2.0	5.0	1.經標示外使用公告核 准使用於梨果類黑斑病(棗為梨果類)。 2.兼防豆菜類白粉病。
12%芬瑞莫可溼性粉劑	FRAC3,G1	白粉病	5,000	5	0.5	1.0	1.經標示外使用公告核 准使用於梨果類輪紋病(棗為梨果類)。 2.兼防瓜類白粉病。
50%免賴得可濕性粉劑	FRAC1,B1	輪斑病	1,500- 3,000	6	1.5	3.0	水稻稻熱病及紋枯病；瓜 類白粉病；香蕉葉斑病。
23%亞托敏水懸劑	FRAC11,C3	炭疽病	3,000	9	0.5	3.0	毛豆、瓜類及果樹之炭疽 病；毛豆及瓜類露菌病； 十字花科與小葉葉類露 菌病。
50%克收欣水分散性粒劑	FRAC11,C3	炭疽病	2,000	6	1.0	1.0	兼防白粉病。

44.2%克收欣水懸劑	FRAC11,C3	炭疽病	2,000	6	1.0	1.0	同上。
23.6%百克敏乳劑	FRAC11,C3	炭疽病	3,000	15	1.0	0.02	
80%免得爛水溶性粒劑	FRAC,M3	炭疽病	500	21	2.5	0.6	兼防疫病。
50%依普同可溼性粉劑	FRAC2,E3	炭疽病	1,000	9	5.0	5.0	1.經標示外使用公告核准使用於梨果類黑斑病(棗為梨果類)。 2.兼防梨炭疽病。
40%腐絕可濕性粉劑	FRAC1,B1	炭疽病	1,200	6	5.0	3.0	1.經標示外使用公告核准使用於梨果類輪紋病(棗為梨果類)。 2.兼防香蕉炭疽病。
純白鏈黴菌素 700 PCU/g 水溶性粉劑		疫病	800	6	免訂	未訂	木瓜果疫病。
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC-M1	疫病	800	免訂	免訂	未訂	兼防疫病。
50%三氟敏水分散性粒劑	FRAC11,C3	銹病	6,000	18	0.5	0.7	瓜類蔓枯病；蓮霧、番石榴、楊桃及檬果炭疽病；蓮霧果腐病；蔥銹病。
25%克熱淨溶液	FRAC-M7	銹病	800	6	0.2	0.5	水稻稻熱病；葡萄葉斑病及銹病。
25%比多農可濕性粉劑	FRAC3,G1	銹病	5,000	6	0.5	0.05	1.經標示外使用公告核准使用於梨果類輪紋病(棗為梨果類)。 2.兼防落花生銹病。
20%達特南水溶性粒劑	IRAC-4A	介殼蟲	2,000	9	0.5	0.7	兼防粉蝨類、薊馬類及蚜蟲類。
100g/L 賜派滅水懸劑	IRAC-23	介殼蟲	1,500	6	0.5	13.0	兼防薊馬類
40.8%陶斯松乳劑	IRAC-1B	介殼蟲	2,000	9	0.5	1.0	兼防飛蝨類、毒蛾類、夜蛾類、蚜蟲類及薊馬類。
40.8%陶斯松水基乳劑	IRAC-1B	介殼蟲	1,500	9	0.5	1.0	同上。
85%加保利可濕性粉劑	IRAC-1A	小白紋毒蛾、台灣黃毒蛾	1,700	9	1.0	30.0	兼防飛蝨類、毒蛾類、夜蛾類、蚜蟲類及薊馬類。

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容 許量(PPM)	日本安全容 許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
40%納乃得水溶性粒劑	IRAC-1A	小白紋毒蛾、台灣黃毒蛾	1,500	6	0.5	1.0	兼防飛蟲類、夜蛾類、蚜蟲類及薊馬類。
25%納乃得水溶性粉劑	IRAC-1A	小白紋毒蛾、台灣黃毒蛾	900	6	0.5	1.0	同上。
2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC-3A	小白紋毒蛾、台灣黃毒蛾	1,000	9	0.5	0.5	兼防夜蛾類、蚜蟲類及薊馬類。
2.8%第滅寧乳劑	IRAC-3A	小白紋毒蛾、台灣黃毒蛾	1,000	9	0.5	0.5	同上
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC-3A	小白紋毒蛾、台灣黃毒蛾	1,000	6	0.5	0.5	同上。
22.5%陶斯松乳劑	IRAC-1B	小白紋毒蛾、台灣黃毒蛾	1,000	9	0.5	1.0	兼防飛蟲類、夜蛾類、蚜蟲類、介殼蟲類及薊馬類。
2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	IRAC-3A	夜蛾類 毒蛾類	1,000	6	0.4	0.5	兼防毒蛾類、夜蛾類、葉蟬類、蚜蟲類及薊馬類。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC-3A	夜蛾類 毒蛾類	1,000	6	0.4	0.5	同上。
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC-3A	夜蛾類 毒蛾類	1,000	6	0.4	0.5	同上。
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC-5	夜蛾類 毒蛾類	2,000	6	0.2	0.2	兼防薊馬
10%得芬瑞可濕性粉劑	IRAC-21A	柑桔葉蟬	3,000	6	1.0	0.5	
15%亞醃蟎水懸劑	IRAC-20B	柑桔葉蟬	1,500	6	0.1	2.0	
30%賜派芬水懸劑	IRAC-23	柑桔葉蟬	2,500	15	0.5	5.0	

1%密滅汀乳劑	IRAC-6	柑桔葉蟬	1,500	6	0.2	0.2	
15%芬殺蟎水懸劑	IRAC-21A	柑桔葉蟎	2,000	6	0.5	未訂	
10%依殺蟎水懸劑	IRAC-10B	柑桔葉蟎	3,500	3	0.2	0.5	
50%芬佈賜可濕性粉劑	IRAC-12B	葉蟎類	1,500	10	2.0	3.0	
10%克凡派水懸劑	IRAC-13	葉蟎類	2,000	15	0.5	2.0	兼防夜蛾類、毒蛾類及薊馬類。
39.5%扶吉胺水懸劑	FRAC 29,C5	葉蟎類	1,500	9	0.5	0.5	
20%賽芬蟎水懸劑	IRAC-25	葉蟎類	2,000	14	0.02	2.0	
20%畢達本可濕性粉劑	IRAC-21A	葉蟎類	2,000	6	0.5	2.0	公告標示外使用
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC-3A	葉蟎類	1,500	12	0.5	0.3	1.公告標示外使用 2.兼防蚜蟲類、薊馬類、 葉蟬類及蝶蛾類
9.6%益達胺溶液	IRAC-4A	蚜蟲	1,500	9	0.5	4.0	兼防粉蝨類及薊馬類。
40.8%陶斯松乳劑	IRAC-1B	蚜蟲	2,000	9	0.5	1.0	兼防飛蝨類、毒蛾類、夜 蛾類、蚜蟲類及薊馬類。
2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	IRAC-3A	蚜蟲	1,000	6	0.4	0.5	兼防毒蛾類、夜蛾類、葉 蟎類、介殼蟲類及薊馬類 。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC-3A	蚜蟲	1,000	6	0.4	0.5	同上。
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC-3A	蚜蟲	1,000	6	0.4	0.5	同上。
10%氟尼胺水分散性粒劑	IRAC-9C	蚜蟲	3,000	6	0.2	0.4	兼防粉蝨類及薊馬類。
30%裕必松可濕性粉劑	IRAC-1B	蚜蟲	1,000	15	1.0	1.0	
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC-3A	蚜蟲	1,400	10	0.5	0.3	1.公告標示外使用 2.兼防葉蟎類、薊馬類、 葉蟬類及蝶蛾類
2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	9	0.5	0.5	兼防夜蛾類、毒蛾類及蚜 蟲類。
2.8%第滅寧乳劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	9	0.5	0.5	同上。
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	6	0.5	0.5	同上。

藥劑名稱	作用機制 代碼	核准防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全採收期 (天)	台灣安全容 許量(PPM)	日本安全容 許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於 其他病蟲害防治
2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	6	0.4	0.5	兼防夜蛾類、毒蛾類、蚜蟲類、粉蝨類及薊馬類。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	6	0.4	0.5	同上。
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	6	0.4	0.5	同上。
40.8%陶斯松乳劑	IRAC-1B	薊馬	2,000	9	0.5	1.0	兼防飛蝨類、毒蛾類、夜蛾類、蚜蟲類及薊馬類。
28.8%益達胺溶液	IRAC-4A	薊馬	4,500	9	0.5	4.0	兼防粉蝨類及蚜蟲類。
9.6%益達胺水懸劑	IRAC-4A	薊馬	1,500	9	0.5	4.0	同上。
9.6%益達胺溶液	IRAC-4A	薊馬	1,500	9	0.5	4.0	同上。
20%達特南水溶性粒劑	IRAC-4A	薊馬	2,000	9	0.5	0.7	兼防粉蝨類、介殼蟲類及蚜蟲類。
10%克凡派水懸劑	IRAC-13	薊馬	1,500	15	0.5	2.0	兼防夜蛾類、毒蛾類及葉蟬類。
16%可尼丁水溶性粒劑	IRAC-4A	薊馬	3,000	9	1.0	4.0	兼防粉蝨類及蚜蟲類。
20%亞滅培水溶性粉劑	IRAC-4A	薊馬	4,000	6	1.0	1.0	兼防粉蝨類及蚜蟲類。
40%丁基加保扶可濕性粉劑	IRAC-1A	薊馬	1,200	15	0.5	0.2	兼防介殼蟲類及蚜蟲類。
48.34%丁基加保扶乳劑	IRAC-1A	薊馬	1,200	15	0.5	0.2	同上。
10%亞滅寧乳劑	IRAC-3A	薊馬	3,000	6	2.0	0.5	
10%亞滅寧水懸劑	IRAC-3A	薊馬	3,000	6	2.0	0.5	
3%亞滅寧水基乳劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	6	2.0	0.5	
3%亞滅寧乳劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	6	2.0	0.5	
100g/L 賜派滅水懸劑	IRAC-23	薊馬類	1,500	6	0.5	13.0	兼防介殼蟲

備註：具有相同作用機制，應避免同時使用或輪替使用。