

蓮霧病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期

高雄區農業改良場 1140401 修訂

藥劑名稱	作用 機制	防治 病蟲害	稀釋 倍數	安全 採收期	安全容許 量(PPM)	備 註
70%甲基多保淨可濕性粉劑⑤	FRAC 1,B1	炭疽病	1,000	6	2.0	開花初期施藥，施藥至套袋前為止
24.55%貝芬四克利濃懸乳劑⑤	FRAC 1,B1 FRAC 3,G1	炭疽病	2,500	9	貝芬替 2.0 四克利 0.5	開花盛期起每隔 7 天施藥一次，連續 6 次或至套袋前為止
53%腐絕快得寧可濕性粉劑⑤	FRAC 1,B1 FRAC M1	炭疽病	1,200	6	腐絕 5.0 快得寧 2.0	開花盛期施藥
56%貝芬硫醯可濕性粉劑⑤	FRAC 1,B1 FRAC M9	炭疽病	1,000	15	貝芬替 2.0 腈硫醯 0.2	開花盛期施藥
31.6%貝芬撲克拉濃懸乳劑	FRAC 1,B1 FRAC 3,G1	炭疽病	2,500	9	貝芬替 2.0 撲克拉 1.0	開花末期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續 4 次或至套袋前為止。
23.7%依普同水懸劑	FRAC 2,E3	炭疽病	800	12	5.0	
25.9%得克利水基乳劑⑤	FRAC 3,G1	炭疽病	2,000	6	2.0	開花初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，至套袋前為止。
50%撲克拉錳可濕性粉劑	FRAC 3,G1	炭疽病	4,000	6	1.0	本劑試驗時加展著劑「日展寶」3000 倍
43.7%三氟敏水懸劑	FRAC 11,C3	炭疽病	3,000	20	1.0	開花盛期施藥，間隔 7-10 天。施藥次數為 3-4 次
23.6%百克敏水懸劑	FRAC 11,C3	炭疽病	2,400	15	1.0	開花初期施藥，施藥至套袋前為止

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 11,C3	炭疽病	3,000	6	1.0	開花盛期施藥。結果後每 14 天施一次。 對水中生物有中等毒性，具魚毒性
44.2%克收欣水懸劑⑤	FRAC 11,C3	炭疽病	2,000	6	5.0	開花盛期施藥
32.5%亞托待克利水懸劑⑤	FRAC 11, C3 FRAC 3, G1	炭疽病	3,000	30	亞托敏 1.0 待克利 1.0	開花盛期施藥(限於開花期使用)
80%免得爛水分散性粒劑	FRAC M3	炭疽病	500	14	5.0	開花初期施藥，施藥至套袋前為止
80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	400	30	5.0	開花初期施藥，施藥至套袋前為止
65%得思地可濕性粉劑	FRAC M3	炭疽病	600	15	二硫代 5.0	謝花幼果施藥
40%克熱淨（烷苯磺酸鹽）可濕性粉劑	FRAC M7	炭疽病	1,500	6	0.5	開花盛期施藥
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑⑤	FRAC 9,D1 FRAC 12 E2	炭疽病	2,000	12	賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	施藥至套袋前為止
42.2%腈硫醃水懸劑	FRAC M9	炭疽病	1,200	9	0.2	開花初期施藥，施藥至套袋前為止
16%腈硫克敏水分散性粒劑	FRAC M9 FRAC 11,C3	炭疽病	1,500	12	腈硫醃 0.2 百克敏 1.0	開花初期施藥，施藥至套袋前為止
500g/L 三氟派瑞水懸劑	FRAC 11 FRAC 7	炭疽病	4,000	7	三氟敏 1.0 氟派瑞 2.0	謝花幼果期開始施藥
50%保粒快得寧可濕性粉劑	FRAC 19, H4 FRAC M1	炭疽病	1,000	6	保粒黴素免訂 快得寧 2.0	開花盛期施藥
43%嘉賜貝芬可濕性粉劑⑤	FRAC 24,D3 FRAC 1,B1	炭疽病	1,000	18	嘉賜黴素未訂 貝芬替 2.0	開花盛期施藥
39.5%扶吉胺水懸劑	FRAC 29,C5	炭疽病	2,000	6	0.5	開花盛期施藥
1x10 ⁹ CFU/mL 貝萊斯芽孢桿菌 BF 水懸劑	FRAC BM02	炭疽病	600	免訂	免訂	幼果期開始施藥

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

1x10 ⁹ CFU/mL 枯草桿菌 KHY8 水懸劑	FRAC BM02	炭疽病	500	免訂	免訂	自開花初期開始施用，每 7-10 天使用 1 次，至套袋或果實採收為止。
52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	FRAC 11,C3 FRAC 27, un01	疫病	1,500	12	凡殺同 2.0 克絕 1.0	病害發生初期開始施藥
9.4%賽座滅水懸劑	FRAC 21,C4	疫病	3,000	9	2.0	開花盛期開始施藥至套袋前為止
81.3%嘉賜銅可濕性粉劑⑤	FRAC 24,D3	疫病	750	6	免訂	開花盛期施藥至套袋前為止
43.5%嘉賜快得寧可濕性粉劑⑤	FRAC 24,D3 FRAC M1	疫病	1,500	6	嘉賜黴素未訂 快得寧 2.0	幼果期開始施藥
80%福賽快得寧可濕性粉劑⑤	FRAC 33, un02 FRAC M1	疫病	1,200	6	福賽得 20 快得寧 2.0	幼果期施藥
18.7%達滅克敏水分散性粒劑	FRAC 40 F5 FRAC 11,C3	疫病	1,000	15	達滅芬 0.5 百克敏 1.0	開花盛期開始施藥，施藥至套袋前為止
60.8%氟比拔克水懸劑⑤	FRAC43,B5 FRAC28,F4	疫病	1,000	30	氟比來 2.0 普拔克 9.0	具中等呼吸急毒性 具魚毒性
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	疫病	800	6	免訂	病害發生初期開始施藥。
280g/L 曼普歐西比水懸劑	FRAC 49,40	果疫病	5,000	14	曼普胺 1.0 歐西比 0.2	病害發生初期開始施藥
38%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7,C2 FRAC11 C3	果腐病	1,500	21	白克列 4.0 百克敏 1.0	對水中生物有劇毒性
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑 ⑤	FRAC 9,12	果腐病	1,500	12	賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	開花初期施藥
43.7%三氟敏水懸劑	FRAC 11,C3	果腐病	5,000	21	1.0	開花初期起施藥，施藥至套袋前停止
50% 1x10 ⁹ CFU/G 枯草桿菌 Y1336可溼性粉劑	FRAC BM02	果腐病	500	免訂	免訂	開花盛期施藥

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

20%覆滅蟎水溶性粉劑	IRAC 1A	薊馬類	600-800	14	0.4	害蟲發生時開始施藥
40%丁基加保扶可濕性粉劑⑤	IRAC 1A	薊馬類	1,600	15	2.0	對蜜蜂有劇毒性
21.5%免扶賽洛寧乳劑⑤	IRAC 1A IRAC 3A	薊馬類	1,500	15	免扶克 0.1 賽洛寧 1.0	對蜜蜂有毒性
40%加保福化利可濕性粉劑⑤	IRAC 1A IRAC 3A	薊馬類	2,000	14	加保利 0.5 福化利 1.0	害蟲發生時開始施藥
42%益洛寧可濕性粉劑	IRAC 1B IRAC 3A	薊馬類	1,500	9	益滅松 1.0 賽洛寧 1.0	對蜜蜂有中等毒性
10%亞滅寧水懸劑	IRAC 3A	薊馬類	4,000	6	2.0	對蜜蜂有劇毒性。對水中生物有劇毒性
5%合芬寧膠囊懸著劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	9	1.0	害蟲發生時開始施藥。對蜜蜂有劇毒性
25%福化利乳劑	IRAC 3A	薊馬類	3,000	18	1.0	本劑試驗時加協力劑「消抗靈」1,000倍
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	薊馬類	2,000	6	1.0	對蜜蜂有劇毒性，避免開花期施藥
2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	IRAC 3A	薊馬類	2,000	6	1.0	同上
2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,500	6	0.2	對蜜蜂有毒性。對水中生物具有劇毒性
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A	薊馬類	1,500	6	0.2	同上
16%可尼丁水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	3,000	21	1.0	對蜜蜂劇毒性，避免開花期施藥。勿施藥於自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區
9.6%益達胺溶液⑤	IRAC 4A	薊馬類	2,000	9	1.0	對蜜蜂劇毒性。具中等魚毒性。
18.2%益達胺溶液⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	9	1.0	對蜜蜂有劇毒性。具中等魚毒性。
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	9	1.0	對蜜蜂有中等毒性

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	3,000	9	1.0	對蜜蜂有劇毒性。具輕等眼睛、皮膚刺激性、具中等呼吸急毒性。
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5	薊馬類	3,000	6	0.2	對蜜蜂有劇毒性，避免開花期施藥
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	薊馬類	1,500	12	0.5	對蜜蜂有劇毒性。具中等呼吸急毒性、具中等口服急毒性、具中等皮膚急毒性、具中等皮膚刺激性。對水中生物有劇毒性，具魚毒性。具高鳥類毒性。
100g/L賜派滅水懸劑⑤	IRAC 23	薊馬類	1,500	14	2.0	對蜜蜂有毒性。具中等呼吸急毒性、具中等皮膚過敏性。具魚毒性。
40%加保福化利可濕性粉劑⑤	IRAC 1A,3A	葉蟬類	2,000	18	加保利 0.5 福化利 1.0	
42%益洛寧可濕性粉劑	IRAC 1B,3A IRAC 3A	葉蟬類	2,000	9	益滅松 1.0 賽洛寧 1.0	對蜜蜂有中等毒性，避免花期施藥
20%矽護芬可濕性粉劑	IRAC 3	葉蟬類	2,000	12	2.0	
2.9%貝他賽扶寧乳劑	IRAC 3A	葉蟬類	1,500	6	賽扶寧 0.5	對蜜蜂有劇毒性，避免開花期施藥
3%亞滅寧水基乳劑	IRAC 3A	葉蟬類	1,000	6	2.0	同上
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	葉蟬類	2,000	9	1.0	同上
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	葉蟬類	4,000	6	1.0	對蜜蜂有劇毒性。具中等眼睛刺激性、具中等口服急毒性、具中等呼吸急毒性、具強烈皮膚刺激性、具中等皮膚過敏性。對水中生物有劇毒性，具魚毒性。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	葉蟬類	4,000	6	1.0	同上
75%第滅達胺水分散性粒劑⑤	IRAC 3A IRAC 4A	葉蟬類	10,000	25	第滅寧 0.2 益達胺 1.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
25%賽速安水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	葉蟬類	7,500	12	0.5	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	葉蟬類	4,000	12	1.0	具中等呼吸急毒性。對蜜蜂有中等毒性。
18.2%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	葉蟬類	6,000	9	1.0	同上
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	葉蟬類	3,000	9	1.0	同上
11%百利普芬水基乳劑	IRAC 7C	介殼蟲類	1,500	9	0.5	
99%礦物油乳劑	FRAC NC	介殼蟲類	200	免訂	免訂	
21.8%速殺氟水懸劑⑤	IRAC 4C	介殼蟲類	3,000	7	2.0	對蜜蜂有劇毒性，避免開花期施藥
2.9%貝他賽扶寧乳劑	IRAC 3A	圓紋捲 葉蛾	1,000	6	賽扶寧 0.5	同上
54%(15,000 IU/mg) 鮎澤蘇力菌 NB-20水分散性粒劑	FRAC BM02 IRAC 11A	鱗翅目 害蟲	1,000	免訂	免訂	害蟲發生時開始施藥
5%賽扶寧水基乳劑	IRAC 3A	東方 果實蠅	1,600	15	0.5	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
46.5%愛殺松水基乳劑	IRAC 1B	葉蟎類	800	21	0.5	
10%芬普寧水懸劑	IRAC 3A	葉蟎類	1,000	9	0.5	具魚毒性
1%密滅汀乳劑	IRAC 6	葉蟎類	1,500	6	0.2	對水中生物有劇毒性
10%得芬瑞可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蟎類	2,000	7	1.0	害蟎發生時開始施藥 對水中生物有劇毒性，具魚毒性
15%芬殺蟎水懸劑	IRAC 21A	葉蟎類	2,500	7	0.1	
30%賜派芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,500	15	2.0	
240g/L 賜滅芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,000	14	2.0	對水中生物有劇毒性，可能危害天敵
240g/L 賜派芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,000	14	2.0	對水中生物有毒性，具魚毒性
20%賽芬蟎水懸劑	IRAC 25	葉蟎類	2,000	7	1.0	害蟎發生時開始施藥
39.5%扶吉胺水懸劑	FRAC 29,C5	葉蟎類	1,500	9	0.5	對水中生物有劇毒性，具魚毒性

在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	米爾頓 絨小蜂	1,500	6	0.2	對蜜蜂具輕等毒性
2.4%第滅寧水懸劑	IRAC 3A		1,500	6	0.2	同上
9.6%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A		2,000	9	1.0	對蜜蜂有劇毒性，避免開花期施藥。
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5		3,000	6	0.2	對蜜蜂有劇毒性，避免開花期施藥。
10%勃激素A3水溶性粉劑		生長調節	20,000	-	-	花蕾形成初期至豆粒期施藥 2 次，花謝後幼果期施藥 1 次。 ※選擇午後天氣陰涼時施藥
40%勃激素A3水溶性粒劑			60,000			花蕾外形達分粒初期、豆粒期及謝花幼果期各噴施 1 次，共 3 次。 ※選擇午後天氣陰涼時，將藥劑均勻噴施全株
23%巴豆素水懸劑		抑制徒長	1,000			5 至 6 月間大量抽梢後每年施藥 1 次。 每年限用一次，使用本藥劑後不可再使用其他抑制徒長劑或方法。

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。**☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：**

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



外銷蓮霧病蟲草害防治用藥參考基準



在噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。