



新聞資料

農業部高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 114026 號

中華民國 114 年 7 月 4 日

熱帶性低氣壓即將來襲 高雄農改場提醒農友務必提前防範

根據中央氣象署最新預報，熱帶性低氣壓（可能成為颱風「丹娜絲」）目前位於巴士海峽，朝西北方向移動，預計今晚至明晨發布海上警報，7 月 5 日至 6 日影響臺灣地區，將伴隨強風與大量降雨，請農友務必嚴加防範。高雄區農業改良場（以下簡稱高雄農改場）籲請農友密切注意氣象署最新預報資訊，加強防災準備以降低損害。

高雄農改場羅正宗場長提醒農友，強風瞬間豪大雨恐造成作物倒伏折損，如香蕉、棗及木瓜等易倒伏斷裂植株，請強化立柱、網室固定及田區殘枝落果清理等措施；確認排水溝無阻塞，避免淹水。若值施用化學肥料期間，注意未來幾天天氣，必要時分次減量，以免雨水流失肥料並加重根系負擔。木瓜、金煌芒果、番石榴及紅龍果等正值採收期，已成熟的果實應儘速收成以減少損失；蓮霧陸續進入修剪及催花準備期，應儘速移除或粉碎修剪後枝條，避免阻礙排水系統。目前高屏地區少量二期水稻正值分蘗期，提醒農友保持排水暢通，颱風過後積水退去，暫時保持排水狀態，待植株挺立後再灌溉，若葉片破損，應加強防治白葉枯病。

羅場長進一步指出連續降雨容易誘發病害與生理障礙，建議木瓜事先疏果以減輕植株負擔；紅龍果開花後應移除花瓣，並可噴施 62.5% 賽普護汰寧粒劑 2000 倍預防濕腐病。果菜類蔬菜（瓜果、茄果及豆類）在颱風、大雨來臨前，建議將生育期或苗期植株加強固定在支架或尼龍網上。已達結果採收期之田區請儘快將適收果實採收銷售或貯藏。沒有防雨設施的葉菜類蔬菜則建議在雨前採收完畢，各類蔬菜園均須加強田區排水，避免長時間浸水。風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀的 1000 倍水溶液進行疫病預防。風雨前後亦可施用廣效性的 27.12% 三元硫酸銅水懸劑，搭配清園及田間衛生管理措施，以防病害擴散蔓延。

羅場長強調：「颱風前的準備工作是降低災害風險的關鍵」，高雄農改場已成立多項作物技術服務團，提供防颱、災後復耕與技術諮詢。如農友遇到種植或防災相關問題，歡迎洽詢高雄農改場，技術人員將竭誠提供協助與建議。

● 高雄農改場技術服務團

https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=8959

聯絡人：李文豪副研究員、朱堉君助理研究員、胡智傑副研究員、黃祥益分場長

電話：08-7389158 轉 740、742、734

07-6622274 轉 101



鳳梨為忌淹水作物，應加強果園周圍排水，必要時重新掘深，避免淹水造成植株腐爛。



雨後紅龍果的花及果實容易罹患濕腐病，應事前進行病害防治。



香蕉為易倒伏作物，應加強立支柱固定。



葉菜類蔬菜較不耐風雨，應儘速採收。