

風茹病蟲害防治用藥摘要表

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收

高雄區農業改良場 1141205 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	防治 病蟲害	稀釋 倍數	每公頃 施藥量	安全 採收期 (天)	安全 容許量 (PPM)	備 註
24.9%待克利水懸劑⑤	FRAC 3, G1	炭疽病	3,000	0.08-0.3 公升	21	2.0	
23.6%百克敏水懸劑	FRAC 11, C3	炭疽病	3,000	0.08-0.5 公升	21	5.0	病害發生初期開始施藥
27.3%三氟得克利水懸劑⑤	FRAC 11, C3 FRAC 3, G1	炭疽病	2,500	0.1-0.4 公升	21	三氟敏 0.3 得克利 1.0	
40%四氣異苯腈水懸劑	FRAC M5	炭疽病	320	0.8-3.1 公升	14	2.0	不可與石灰硫磺劑混合使用
1×10 ⁹ CFU/mL 貝萊斯芽孢桿菌 BF 水懸劑	FRAC BM02	炭疽病	600	0.4-1.66 公升	-	-	病害發生初期開始施藥
80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	-	白粉病	4,000	0.3-1 公斤	免訂	免訂	避免與強酸性藥劑混合使用
99%礦物油乳劑	FRAC NC	白粉病	500	0.5-2 公升	免訂	免訂	高溫時，提高濃度可能引起植株幼嫩 部位發生藥害。
20%維利黴素溶液	FRAC 26	細菌性 斑點病	1,200	0.2-0.8 公升	免訂	免訂	延伸使用
1×10 ⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	FRAC BM02	灰黴病	600	0.4-1.7 公斤	免訂	免訂	病害發生初期開始施藥
1×10 ⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿 菌 QST713 水懸劑	FRAC BM02	露菌病	400	2.0-3.0 公升	免訂	免訂	病害發生初期開始施藥

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

1×10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽孢桿菌 Tcba05 水懸劑	FRAC BM02	萎凋病	250	36.3 公升	-	免訂	種子直播或幼苗定植後，10-14 天開始施用，以每株 250 毫升藥液量於植株莖基部或根圍進行土壤澆灌。 應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用。
1%密滅汀乳劑	IRAC 6	葉蟎類	1,500	0.2-0.7 公升	6	2.0	具魚毒性、水中生物劇毒性
240g/L 賜滅芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類	2,000	0.45-0.6 公升	21	5.0	可能危害天敵
2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,000	0.3-1 公升	10	5.0	
31.6%護賽寧乳劑	IRAC 3A	蚜蟲類	8,000	0.03-0.13 公升	10	10.0	
5.7%賽扶寧乳劑	IRAC 3A	蚜蟲類	2,000	0.1-0.5 公升	18	5.0	避免與波爾多液混合使用。
16%可尼丁水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	4,000	0.1-0.3 公斤	21	5.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	6,000	0.04-0.2 公斤	12	2.0	對蜜蜂中等毒性，避免花期施用
9.6%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	4,200	0.1-0.2 公升	12	3.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑⑤	IRAC 4A IRAC 3A	蚜蟲類	4,000	0.1-0.3 公升	21	賽速安 1.0 賽洛寧 2.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
10%賽速安水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	2,000	0.1-0.5 公升	21	1.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用 避免與波爾多液混用使用
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	2,000	0.1-0.5 公升	15	10	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
1%密滅汀乳劑	IRAC 6	蚜蟲類	1,500	0.2-0.7 公升	6	2.0	
50%培丹水溶性粉劑⑤	IRAC 14	蚜蟲類	1,000	0.3-1 公斤	6	1.0	高溫下施用易引起幼苗藥害。 對蜜蜂有劇毒性

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

40%納乃得水溶性粒劑⑤	IRAC 1A	薊馬類	1,600	0.2-0.6 公斤	21	1.0	
500G/L佈飛松乳劑	IRAC 1B	薊馬類	800	0.3-1.3 公升	21	0.5	對蜜蜂有輕等毒性
2.46%賽洛寧微膠囊懸著液	IRAC 3A	薊馬類	2,000	0.1-0.5 公升	12	2.0	同上
10%百滅寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	0.3-1 公升	14	3.0	
9.6%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	1,500	0.2-0.7 公升	12	3.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	0.1-0.3 公斤	12	2.0	對蜜蜂中等毒性，避免花期施用
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	薊馬類	1,000	0.3-1 公斤	21	2.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
9.6%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	粉蝨類	1,500	0.2-0.7 公升	12	3.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
11%百利普芬水懸劑	IRAC 7C	粉蝨類	1,000	0.3-1 公升	45	5.0	
100G/L賜派滅水懸劑⑤	IRAC 7C	粉蝨類	1,000	0.3-1	21	1.0	
40%納乃得水溶性粒劑⑤	IRAC 1A	夜蛾類 毒蛾類	1,600	0.2-0.6 公斤	21	1.0	
10%克凡派水懸劑	IRAC 13	夜蛾類 毒蛾類	1,000	0.3-1 公斤	21	2.0	對蜜蜂有劇毒性，避免花期施用
50%培丹水溶性粉劑⑤	IRAC 14	夜蛾類 毒蛾類	1,000	0.3-1 公斤	6	1.0	高溫下施用易引起幼苗藥害。 對蜜蜂有劇毒性
5%可芬諾水懸劑	IRAC 18	夜蛾類 毒蛾類	1,000	0.3-1 公斤	21	1.0	
80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑		甜菜夜蛾		設置 11-18 個點			特用。 不宜同時將兩種不同性費洛蒙 置於同一個誘蟲盒內。誘蟲盒至少每 週清 1 次

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

91.2%斜紋夜蛾費洛蒙蒸散劑		斜紋夜蛾		設置 5-10 個點		特用。1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為 5mg。2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘盒內。3.不宜同時將兩種不同性費洛蒙置於同一個誘蟲盒內。4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。5.濕度低於攝氏 15℃ 以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。每公頃設置點數 5 至 10 個，每個點前後距離約 50 公尺、左右距離約 20 公尺。誘餌以“S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。誘蟲盒懸掛高度離地面 1 至 1.5 公尺處，或於作物生長點上方 50 至 60 公分處。誘蟲盒以中改式誘蟲盒、制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。
-----------------	--	------	--	---------------	--	---

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。

*㊟系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

*特用-香辛植物及其他草木本植物-菊科特用作物-風茹 香菇、風茹草

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。