



# 新聞資料

農業部高雄區農業改良場  
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 115025 號

中華民國 115 年 6 月 5 日

## 鋒面報到天氣不穩 高雄農改場籲農友加強防汛措施

依據中央氣象署最新預報，今（6/5）日受低氣壓影響，易有短延時強降雨，不穩定的天氣型態可能持續數日。高雄區農業改良場（以下簡稱高雄農改場）提醒農友，鋒面影響期間常伴隨間歇性強降雨、雷擊及強陣風，請務必密切注意氣象預報，及早預作田間防汛措施，以減少作物損失。

高雄農改場羅正宗場長提醒農友，6月進入「芒種」節氣後，氣溫與雨量明顯升高，劇烈降雨或連續豪雨易導致田間浸水、植株根系受損或病害蔓延，為降低災損，農友應掌握以下防範重點：一、確保排水系統暢通：汛期前應檢視並疏通田區周邊排水溝渠，確保排水順暢，減少田間浸水時間。二、儘速採收：正值盛產期蔬果，如芒果、荔枝及瓜類作物等，應在雨前儘快採收銷售或貯藏；水稻若已屆收穫期，應適期採收以防倒伏及穗上發芽。三、穩固設施：鋒面常伴隨強烈對流，應加強固定蔬菜及花卉設施的遮蔭網、防蟲網或防雨塑膠布，防止瞬間強風造成設施破損。四、調整施肥管理：若遇連續降雨，肥料應分次減量施用，避免強降雨造成肥料流失，或因積水於低窪處導致鹽害。五、強化病害防治：風雨來臨前，瓜果及豆菜類可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀（1,000 倍水溶液）以誘發抗病性。風雨前後可施用 27.12%三元硫酸銅水懸劑，預防各類真菌及細菌性病害蔓延。

羅場長進一步指出，低窪地區果園務必注意排水，必要時應設置抽水設備。水稻若發生倒伏，請農友儘速排水，避免品質劣化。紅龍果於花謝後應儘速摘除花瓣，以防降雨導致濕腐病。最後強調，防汛期間的預防措施是降低農損的關鍵。高雄農改場已成立各項作物技術服務團，提供專業技術諮詢服務。農友若有相關預防措施或災後復耕等技術問題，歡迎逕洽高雄農改場，技術人員將竭誠服務。

### ● 高雄農改場技術服務團

[https://www.kdais.gov.tw/theme\\_data.php?theme=news&sub\\_theme=announcement&id=8959](https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=8959)

聯絡人：李文豪副研究員、周國隆研究員、陳富永副研究員、陳正恩研究員、黃祥益分場長

電話：08-7389158 轉 740、708、738、760

07-6622274 轉 100



豪雨過後須檢修排水溝渠道設施，以維持排水系統暢通。



豪雨過後，田區積水應儘快排除，避免根部受損，亦可減少病菌危害。



水稻已屆採收期，若遇倒伏，應儘速排水或適期收穫。



汛期栽培瓜類以高畦深溝利於排水



降雨易導致紅龍果濕腐病，花謝後應儘速摘除花瓣。