

茄科果菜類少量作物病蟲害防治用藥摘要表-甜椒、辣椒、枸杞、香瓜茄、樹番茄

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以防檢署公告為準

◎農友施藥請遵守安全採收期 ◎依《農藥管理法》規定農藥不能在網路上販賣

高雄區農業改良場 1150612 修訂

藥劑名稱	作用機制 代碼	防治 病蟲害	稀釋 倍數	每公頃 施藥量	安全 採收期 (天)	安全 容許量 (PPM)	備 註
500g/L 氟印淨水懸劑 (甜椒、辣椒)		根瘤線蟲	3,000	2 公升	依使用方法用藥，無需訂定安全採收期	辣椒 0.02 甜椒 0.03	<u>僅登記甜椒、辣椒</u> 。移苗前約 1-2 天每株移栽穴位澆灌 200 毫升藥液 1 次
480g/L 氟速芬乳劑⑤	Unknown or multi-site	根瘤線蟲	-	6 公升	未訂	0.5	加水至 500 公升。 <u>種植前 7 天</u> ，於土壤濕潤情況下，將稀釋液噴佈於土表，立即混拌至土深 15 公分處。
400g/L 氟派瑞水懸劑⑤	FRAC 7	根瘤線蟲	3,000	0.1-0.4 公升		0.4	施用前請保持土壤濕潤。於 <u>植株定植後澆灌藥液 1 次</u> ，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。
3%加福松微粒劑 (定植前施用)	IRAC 1B	切根蟲	-	50 公斤	-	0.1	<u>限定植前施藥</u>
5%毆殺滅粒劑⑤ (種植前使用)	IRAC 1A	地下部 線蟲類	-	40-80 公斤	-	2.0	移植當日將藥劑條施於 15 公分的植溝內，覆土後定植。 <u>限種植前使用，生長期不可施用</u> 。施藥時必須戴手套。
66.5%普拔克溶液⑤	FRAC 28,F4	幼苗疫病	400	15-20 毫升/ 每平方公尺	-	2.0	<u>播種當日灌藥 1 次，發病時再灌藥 1 次</u>
40%滅普寧水懸劑 (限苗床使用)	FRAC 7	苗立枯病	800	-		0.02	<u>限苗床使用</u> 。播種後立即澆灌 800 倍稀釋液 1 次。
23.2%賓克隆水懸劑	FRAC 20	苗立枯病	1,000	0.5-1.5 公升		0.05	播種後澆灌 1 次，隔 10 天再施藥 1 次
1x10 ⁹ CFU/ML 液化澱粉芽 孢桿菌 Tcba05 水懸劑	FRAC BM02	萎凋病	250	36.3 公升	免訂	免訂	<u>種子直播或幼苗定植後，10-14 天開始施用</u> ，以每株 250 毫升藥液量於植株莖基部或根圍進行土壤澆灌。 <u>應避免與銅劑或抗生素成分之殺菌劑混合使用</u> 。

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

50%撲滅寧可濕性粉劑⑤	FRAC 2,E3	白絹病	2,000	0.5 公斤	-	2.0	定植後每株灌注 200 公撮，15 天後再灌注一次。
50%福多寧可濕性粉劑⑤	FRAC 7,C2	白絹病	5,000	0.2 公升	-	2.0	
77%福賽亞汰尼分散性粒劑	FRAC 33,P3	青枯病	700	1.5 公斤	7	福賽得 3.0 亞汰尼 2.0	定植後約 6 葉期開始全株葉面噴施。連續施用 3 次，每次間隔 7 天。
1×10 ⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 可濕性粉劑	FRAC BM02	青枯病	200	0.2 公升/株 (稀釋後藥液量)	免訂	免訂	每株施藥量約 200ml(稀釋後藥液量)。發病初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次，共 5 次。
0.5%可尼丁粒劑⑤	IRAC 4A	粉蝨類	-	60 公斤	-	0.05	定植後於畦上施藥 1 次。 對蜜蜂有劇毒性。
18.41%賽安勃水懸劑⑤ (限苗期使用)	IRAC 28	粉蝨類	2,000	0.5 公升	依使用方法用藥，無需訂定安全採收期	1.3	限苗期使用，依使用方法不須訂定安全採收期。植株移植後 7 天每株灌注藥液 50 毫升 1 次。
20%維利黴素溶液	FRAC 26	細菌性斑點病	1,200	0.4-1.3 公升		免訂	延伸使用
27.12%三元硫酸銅水懸劑	FRAC M1	細菌性斑點病	500	2-3 公升	免訂	免訂	具魚毒性
53.8%氫氧化銅水分散粒劑	FRAC M1	細菌性斑點病	2,000	0.25-1 公斤	6	免訂	
61.4%氫氧化銅水分散性粒劑	FRAC M1	細菌性斑點病	1,500	0.8-1 公斤	-	免訂	
1×10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑	FRAC BM02	細菌性斑點病	600	0.8-2.5 公斤	-	免訂	病害初期開始施藥
1×10 ⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BACY 可濕性粉劑	FRAC BM02	細菌性斑點病	600	2-3 公斤	-	免訂	病害初期開始施藥
30%賽福座可濕性粉劑⑤	FRAC 3	白粉病	3,000	0.2-0.5 公斤	7	1.0	
11.6%四克利水基乳劑⑤	FRAC 3	白粉病	1,500	0.3-1 公升	7	0.5	對水中生物有毒性
250g/L 普克利乳劑⑤	FRAC 3	白粉病	2,500	0.2-0.6 公升	4	0.5	病害發生初期開始施藥
40%邁克尼可濕性粉劑⑤	FRAC 3,G1	白粉病	12,000	0.04-0.1公斤	7	0.5	提高濃度可能引起幼苗藥害

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

13.4%邁克尼水基乳劑⑤	FRAC 3,G1	白粉病	4,000	0.1-0.4公升	7	0.5	
500g/L 氟殺克敏水懸劑	FRAC 7,11	白粉病	5,000	0.1-0.3 公升	6	氟克殺 0.6 百克敏 0.5	<u>具魚毒性</u>
99%礦物油乳劑	FRAC NC	白粉病	500	2-2.5公升	-	免訂	藥液噴施時，必須均勻覆蓋葉面、葉背及植株。
50%白克列水分散性粒劑	FRAC 7,C2	白粉病	2,500	0.2-0.6公斤	7	1.2	
44.2%克收欣水懸劑⑤	FRAC 11,C3	白粉病	2,500	0.2-0.6公升	7	1.0	<u>對水中生物有劇毒性。具魚毒性</u>
50%克收欣水分散性粒劑⑤	FRAC 11,C3	白粉病	3,000	0.2-0.5公斤	7	1.0	
400g/L 芬座克敏水懸劑 (甜椒、辣椒)	FRAC 3,11	炭疽病	2,000	0.4 公升	3	甜椒 滅芬座 0.4 百克敏 0.5 辣椒 滅芬座 0.9 百克敏 0.5	<u>僅登記甜椒、辣椒</u> 於果實幼果時期開始施藥。
24.9%待克利水懸劑⑤	FRAC 3,G1	炭疽病	3,000	0.2-0.5 公升	7	0.5	<u>對水中生物有劇毒性。勿提高劑量，以免發生藥害。適用於枸杞葉。</u>
250g/L 待克利乳劑⑤	FRAC 3,G1	炭疽病	3,000	0.2-0.5 公升	7	0.5	同上
500g/L 氟殺克敏水懸劑	FRAC 7,11	炭疽病	2,500	0.2-0.6 公升	6	氟克殺 0.6 百克敏 0.5	<u>具魚毒性</u> ， <u>禁止施用於水域</u>
500g/L 三氟派瑞水懸劑⑤	FRAC 11,7	炭疽病	2,500	0.4 公升	7	氟派瑞 0.4 三氟敏 0.5	<u>避免重複使用含氟派瑞藥劑</u>
23%亞托敏水懸劑	FRAC 11,C3	炭疽病	1,000	0.2-0.6 公升	6 ----- 設施 12 天	2.0	<u>具魚毒性</u>
23.6%百克敏水懸劑	FRAC 11,C3	炭疽病	3,000	0.2-0.7 公升	6	0.5	生育初期、開花初期或中果期施藥
27.3%三氟得克利水懸劑⑤	FRAC 11,C3 FRAC 3,G1	炭疽病	2,500	0.2-0.6 公升	7	三氟敏 0.5 得克利 1.0	<u>具魚毒性</u>
22.7%腈硫醃水懸劑	FRAC M9	炭疽病	700	1.1-1.7 公升	4	1.0	<u>易發生藥害，勿任意提高濃度或與其他藥劑混合使用</u>
1×10 ⁹ CFU/mL 貝萊斯芽孢桿菌 BF 水懸劑	FRAC BM02	炭疽病	600	0.8-2.5 公斤	-	免訂	病害發生初期開始施藥

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

1×10 ⁹ CFU/mL 貝萊斯芽孢桿菌 N17 水懸劑	FRAC BM02	炭疽病	400	2.5 公升	-	-	開花初期開始施藥
100g/L 扶比胺乳劑 (辣椒)	FRAC 21	炭疽病	800	1.25 公升	3	0.6	<u>僅登記辣椒</u> 病害發生初期開始施藥
23%亞托敏水懸劑⑤	FRAC 1,B1	疫病	1,000	0.5-1.5 公升	6 設施 12 天	2.0	
52.5%凡殺克絕水分散性粒劑	FRAC 11,27	疫病	2,500	0.2-0.6 公斤	6	凡殺同 1.0 克絕 1.0	<u>對水中生物有劇毒性。具魚毒性。</u>
330g/L 凡殺歐西比濃懸乳劑	FRAC 11,49	疫病	2,400	0.5 公升	3	凡殺同 1.0 歐西比 0.15	病害發生初期開始施藥
17.7%安美速水懸劑	FRAC 21,C4	疫病	4,000	0.1-0.4 公升	6 設施 12 天	1.0	<u>對水中生物有劇毒性。具魚毒性。</u>
9.4%賽座滅水懸劑	FRAC 21,C4	疫病	3,000	0.2-0.5 公升	6	2.0	<u>對水中生物有劇毒性。具魚毒性</u>
39.5%普拔克溶液⑤	FRAC 28,E4	疫病	200	15-20 毫升/ 每平方公尺	7	2.0	
50%達滅芬可濕性粉劑	FRAC 40,F5	疫病	4,000	0.1-0.4 公斤	6 設施 12 天	0.5	
250g/L 曼普胺水懸劑 (甜椒、辣椒、枸杞)	FRAC 40,F5	疫病	2,500	0.2-0.6 公升	15 設施 21 天	2.0	<u>登記甜椒、辣椒、枸杞</u> <u>具魚毒性、禁止施用於水域。</u>
525g/L 達滅脫定水懸劑	FRAC 40,H5 FRAC 45,C8	疫病	1,000	0.5-1.5 公升	6 設施 12 天	達滅芬 1.0 滅脫定 2.0	<u>具魚毒性</u>
60.8%氟比拔克水懸劑⑤	FRAC 43,28	疫病	1,000	15-20 毫升/ 每平方公尺	3	氟比來 0.02 普拔克 2.0	<u>務必全株均勻噴施，包含莖基部。</u> <u>具魚毒性。</u>
280g/L 曼普歐西比水懸劑	FRAC 49,40	疫病	2,500	0.4 公升	14	歐西比 0.15 曼普胺 2.0	*曼普胺殘留量： <u>香瓜茄、樹番茄為 0.3ppm</u>

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑	FRAC M1	疫病	400	1.3-3.8 公斤	免訂	免訂	避免與石灰硫磺或礦物油混合使用
75%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑	FRAC M1	疫病	500	1-3 公斤	免訂	免訂	同上
60%免得克敏水分散性粒劑	FRAC M3 FRAC 11,C3	疫病	900	0.6-1.7 公斤	6	二硫代 2.5 百克敏 0.5	對水中生物有劇毒性，禁止施用於水域。
72%鋅錳克絕可濕性粉劑	FRAC M3,27	疫病	500	1-3 公斤	21	二硫代 2.5 克絕 1.0	
1×10 ⁷ CFU/G 蓋棘木黴菌 ICC080/012 可濕性粉劑	FRAC BM02	疫病	2,000	2.5 公斤	免訂	免訂	使用前 24-36 小時，先將本藥劑與水以 1:10 比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至 2,000 倍，每株澆灌 200 毫升。定植前 7 天灌注植穴 1 次，定植當天再澆灌全株 1 次，共 2 次。避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。
200g/L 派滅芬水懸劑	FRAC 7	早疫病	4,000	0.25 公升	3	0.4 甜椒 0.6	使用本藥劑後不可與非本藥劑核准使用範圍輪作，以免蓄積殘留。
5×10 ⁹ CFU/G 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 可溼性粉劑	FRAC BM02	早疫病	600	0.8-2.5 公斤	免訂	免訂	藥液需均勻噴施於植株全株
23.7%依普同水懸劑	FRAC 2,E3	灰黴病	1,000	0.5-1.5 公升	6	1.0	
50%依普同可濕性粉劑	FRAC 2,E3	灰黴病	2,000	0.3-0.8 公斤	6	1.0	
42.4%白克列水懸劑	FRAC 7	灰黴病	1,200	0.4-1.3 公升	7	1.2	
500g/L 氟殺克敏水懸劑	FRAC 7,11	灰黴病	2,500	0.2-0.6 公升	6	氟克殺 0.6 百克敏 0.5	具魚毒性
37.4%派美尼水懸劑	FRAC 9, D1	灰黴病	1,500	0.3-1 公升	3	1.0	高溫高濕下施用易引起藥斑
62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑⑤	FRAC 9, D1 FRAC 12,E2	灰黴病	2,000	0.3-0.8 公斤	7	賽普洛 0.5 護汰寧 1.0	有魚毒性

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

1×10 ⁹ CFU/mL 貝萊斯芽孢桿菌 BF 水懸劑	FRAC BM02	灰黴病	600	0.8-2.5 公升	免訂	免訂	茄科果菜類。病害發生初期開始施藥
1×10 ⁸ CFU/mL 液化澱粉芽孢桿菌 CL3 水懸劑	FRAC BM02	灰黴病	400	0.6-7.5 公升	免訂	免訂	蔬菜。病害發生初期時開始施藥。
1×10 ¹⁰ CFU/g 液化澱粉芽孢桿菌 D747 水分散性粒劑	FRAC BM02	灰黴病	1,000	1-3 公斤	免訂	免訂	蔬菜。病害發生初期開始施藥
38.0%白列克敏水分散性粒劑	FRAC 7,11	黑斑病	3,000	0.2-0.5 公斤	7	白克列 1.2 百克敏 0.5	病害發生初期開始施藥。對 <u>水中生物有劇毒性</u> 。 <u>具魚毒性</u> 。
300g/L 氟克殺水懸劑⑤	FRAC 7,C2	黑斑病	5,000	0.1-0.3 公升	7	0.6	
2%阿巴汀乳劑	IRAC 6	銹蟎類	2,000	0.25-0.75 公升	12	0.02	對蜜蜂有劇毒性 。害蟲發生時開始施藥。
10%芬殺蟎乳劑	IRAC 21A	銹蟎類	1,000	0.5-1.5 公升	7	0.1	
10%得芬瑞可濕性粉劑	IRAC 21A	柑桔葉蟎	3,000	0.17-0.5 公斤	3	0.5	對 <u>水中生物有劇毒性</u> ， <u>具魚毒性</u> 。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	葉蟎類 細蟎類	1,000	0.6-2 公升	6	0.5	對蜜蜂有劇毒性 。 <u>對水中生物有劇毒性</u> 。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	葉蟎類 細蟎類	1,000	0.6-2 公升	6	0.5	同上
2%阿巴汀乳劑	IRAC 6	葉蟎類 細蟎類	1,000	0.25-0.75 公升	12	0.02	對蜜蜂有劇毒性 。 <u>具高魚毒性</u> 。
10%依殺蟎水懸劑	IRAC 10B	葉蟎類 細蟎類	4,000	0.5-1.5 公升	7	0.2	對 <u>水中生物有劇毒性</u> 。
50%芬佈賜水懸劑	IRAC 12B	葉蟎類 細蟎類	1,500	0.3-1 公升	14	1.0	
43.2%必芬蟎水懸劑	IRAC 20D	葉蟎類 細蟎類	2,000	0.5-1 公升	3	0.5	對蜜蜂有中等毒性
5%芬普蟎水懸劑	IRAC 21A	葉蟎類 細蟎類	1,000	0.3-1公升	9	0.01	避免與石灰硫磺合劑混合使用
20%畢達本水懸劑 (禁止空中施藥)	IRAC 21A	葉蟎類 細蟎類	3,000	0.2-0.7 公升	12	0.5	對蜜蜂有劇毒性 。 <u>具魚毒性</u> ，對 <u>水中生物有劇毒性</u> 。 禁止施用於水域及禁止大面積施藥及禁止空中施藥 。

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

240g/L 賜滅芬水懸劑	IRAC 23	葉蟎類 細蟎類	2,000	0.3-0.4 公升	4	2.0	對水中生物有劇毒性 可能危害天敵
20%賽芬蟎水懸劑	IRAC 25	葉蟎類 細蟎類	1,000	1-2公升	7	1.0	登記：甜椒、辣椒、香瓜茄、樹番茄、 枸杞(枸杞 限採收果實者使用)
25%新殺蟎乳劑 (禁止空中施藥)	IRAC un	葉蟎類 細蟎類	500	-	15	1.0	對水中生物有劇毒性及具 <u>魚毒性</u> 。 禁止施用於水域、禁止大面積施藥及禁止空中施藥。
43.2%必芬蟎水懸劑	IRAC 20D	葉蟎類	2,000	0.5-1 公升	3	詳如備註	*必芬蟎殘留量-0.5ppm：香瓜茄、枸杞、 樹番茄。2.0ppm：甜椒。 3.0ppm：辣椒。 <u>對蜜蜂有中等毒性</u> 。可能危害天敵。具 <u>魚毒性</u> 。
10%芬殺蟎乳劑	IRAC 21A	葉蟎類	1,000	0.5-1.5 公升	7	0.1	
10.4%貝賽益達胺水懸劑⑤	IRAC 3A, 4A	粉蝨類	2,000	0.3-1 公升	6	賽扶寧 0.5 益達胺 0.5	對蜜蜂有劇毒性
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	粉蝨類	4,000	0.1-0.5 公斤	6 ----- 設施 12 天	1.0	<u>對蜜蜂有中等毒性</u>
20%達特南水分散粒劑⑤	IRAC 4A	粉蝨類	3,000	0.2-0.7 公斤	3	0.5	對蜜蜂有劇毒性
40.4%賽果培水懸劑⑤	IRAC 4A	粉蝨類	3,300	0.2-0.6 公升	10	3.0	
9.6%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	粉蝨類	1,500	0.3-1 公升	6	0.5	對蜜蜂有劇毒性
11%百利普芬乳劑	IRAC 7C	粉蝨類	1,000	0.5-1.5 公升	7	1.0	具 <u>魚毒性</u>
50g/L 阿扶平水分散性乳劑	IRAC 9D	粉蝨類	1,200	0.7-1 公升	6	0.2	害蟲發生時開始施藥
75g/L 阿扶巴汀水分散性乳劑	IRAC 9D,6	粉蝨類	1,200	0.67 公升	6	阿扶平 0.2 阿巴汀 0.02	避免開花期施藥 害蟲發生時開始施藥
100g/L賜派滅水懸劑⑤	IRAC 23	粉蝨類	1,000	0.5-1.5 公升	7	2.0	<u>對蜜蜂有毒性</u>
10.26%賽安勃水分散性油懸劑	IRAC 28	粉蝨類	800	0.625 公升	3	1.3	害蟲發生時開始施藥
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	蚜蟲類	1,500	0.6-0.8 公升	6 ----- 設施 12 天	1.0	對蜜蜂有劇毒性。 <u>對水中生物有劇毒性。</u>
20%達特南水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	2,000	0.2-0.7 公斤	3	0.5	對蜜蜂有劇毒性

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

20%亞滅培水溶性粒劑⑤	IRAC 4A	蚜蟲類	6,000	0.1-0.5 公斤	6	1.0	設施栽培 12 天停止施藥。 對蜜蜂有中等毒性。
50%滅賜克可濕性粉劑	IRAC 1A	薊馬類	800	0.6-2.5 公斤	15	1.0	茄科果菜類
20%覆滅蟎水溶性粉劑⑤	IRAC 1A	薊馬類	400	1.3-3.8 公斤	9	2.0	提高濃度可能引起藥害 枸杞限採收果實者使用
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	薊馬類	800	0.6-2.5 公升	10	1.0	對蜜蜂有輕等毒性。避免與石灰硫磺劑 混合使用。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	薊馬類	1,000	0.3-0.8 公升	6	0.5	對蜜蜂有劇毒性。對水中生物有劇毒性。
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	0.3-0.8 公升	6	0.5	
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	0.3-0.8 公升	6	0.5	
2.9%貝他賽扶寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,500	0.3-1.3 公升	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性
25%福化利乳劑	IRAC 3A	薊馬類	3,000	0.2-0.7 公升	7	0.5	
10%百滅寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	3,000	0.5-1.5 公升	6	1.0	
2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	0.5-1.5 公升	6	1.0	枸杞、小葉菜類採收前 9 天、果菜類採 收前 6 天停止施藥。對蜜蜂有劇毒性。 對水中生物有劇毒性。
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	薊馬類	1,000	0.5-1.5 公升	6	1.0	
5%賽滅寧水基乳劑	IRAC 3A	薊馬類	1,500	0.3-1 公升	6	2.0	對蜜蜂有毒性。對水中生物有毒性，禁 止施用於水域。
10%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC 3A	薊馬類	3,000	0.2-0.5 公斤	6	2.0	
18.2%益達胺水懸劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	0.15-0.5 公升	6	0.5	對蜜蜂有劇毒性。
20%亞滅培水溶性粉劑⑤	IRAC 4A	薊馬類	4,000	0.1-0.5 公升	6 ----- 設施 12 天	1.0	對蜜蜂有中等毒性
2.5%賜諾殺水懸劑	IRAC 5	薊馬類	1,000	0.5-1.5 公升	3	0.3	對蜜蜂毒性高。對水生生物具中等毒 性，勿使用於飲用水水質水源保護區。
11.6%賜諾殺水懸劑	IRAC 5	薊馬類	4,500	0.1-0.3 公升	3	0.3	對蜜蜂毒性高。對水生生物具中等毒 性，勿使用於飲用水水質水源保護區。
80%賜諾殺可濕性粉劑	IRAC 5	薊馬類	32,000	0.01-0.05 公斤	3	0.3	
11.7%賜諾特水懸劑	IRAC 5	薊馬類	8,000	0.06-0.2 公升	6	甜椒 0.1 其他 0.2	對蜜蜂有劇毒性

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

10%克凡派水懸劑 (禁止空中施藥)	IRAC 13	薊馬類	1,000	0.5-1.5 公升	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性。對水中生物有劇毒性，具魚毒性。 <u>禁止施用於水域</u> 。 <u>禁止大面積施藥</u> 。 <u>禁止空中施藥</u> 。具高鳥類毒性。
7.8%克凡洛寧水懸劑	IRAC 13,3A	薊馬類	2,000	0.25-0.5 公升	6	克凡派 0.5 賽洛寧 0.5	對蜜蜂有劇毒性。害蟲發生時開始施藥。
100g/L 亞克瑞水分散性乳劑	IRAC 30	薊馬類	3,000	0.33-0.67 公升	3	1.0	開花期及生物防治期間避免施藥。害蟲發生初期開始施藥。
43%佈飛松乳劑	IRAC 1B	斑潛蠅類	1,000	0.5-1 公升	7-15	1.0	避免與石灰硫磺劑混合使用。對蜜蜂有輕等毒性。
2%阿巴汀乳劑	IRAC 6	斑潛蠅類	1,000	0.5-2 公升	12	0.02	對蜜蜂有劇毒性
8.9%賽滅淨溶液⑤	IRAC 17	斑潛蠅類	1,000	0.5-2 公升	12	0.5	
75%賽滅淨可濕性粉劑⑤	IRAC 17	斑潛蠅類	4,000	0.1-0.5 公斤	12	0.5	
54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑	IRAC 11A	鱗翅目害蟲	1,000	0.5-2 公斤	免訂	免訂	蔬菜。害蟲發生時開始施藥
48.1%鮎澤蘇力菌 ABTS-1857 水分散性粒劑	IRAC 11A	鱗翅目害蟲	1,000	0.8-1 公斤	免訂	免訂	茄科果菜類
60%鮎澤蘇力菌Ab12可濕性粉劑	IRAC 11A	鱗翅目害蟲	750	0.67-2.67 公斤	免訂	免訂	蔬菜。害蟲發生時開始施藥
22%美氟綜水懸劑	IRAC 22B	夜蛾類	1,000	0.5-1.5 公升	3	0.6	具魚毒性
200g/L 特安勃水懸劑⑤	IRAC 28	夜蛾類	10,000	0.05-0.1 公升	3	0.1	害蟲發生時全株施藥 1 次。 <u>避免於開花期使用</u> 。 <u>與非本藥劑核准範圍作物輪作期間為 30 天，以免蓄積殘留</u> 。
75%硫敵克可濕性粉劑⑤	IRAC 1A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	3,000	0.2-0.6 公升	6	1.0	具魚毒性
34%硫敵克水懸劑⑤	IRAC 1A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1.5 公升	6	1.0	具魚毒性
40%納乃得水溶性粒劑⑤	IRAC 1A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,500	-	7	1.0	

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

35%白克松可濕性粉劑	IRAC 1B	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	3,000	0.25-0.5 公斤	15	0.5	
50%馬拉松乳劑	IRAC 1B	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	500	2 公升	4	1.0	番茄幼苗對馬拉松較敏感。不可與鹼性藥劑混用。
58%乃力松乳劑	IRAC 1B	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1 公升	4	1.0	對水中生物有劇毒性。禁止施用於水域。
33%佈飛百滅寧乳劑	IRAC 1B,3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1.5 公升	21	佈飛松 1.0 百滅寧 1.0	對水中生物有劇毒性。具高魚毒性，禁止施用於水域。
30%佈飛賽滅寧乳劑	IRAC 1B,3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.6-1.9 公升	21	佈飛松 1.0 賽滅寧 2.0	
2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1 公升	6	0.5	對蜜蜂有劇毒性。對水中生物有劇毒性。
2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1 公升	6	0.5	對蜜蜂有劇毒性。對水中生物有劇毒性。
2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1 公升	6	0.5	對蜜蜂有劇毒性。對水中生物有劇毒性。
10%百滅寧乳劑	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	3,000	0.2-0.5 公升	6	1.0	
20%芬化利水基乳劑	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	3,000	0.2-0.5 公升	10	0.5	對水中生物有劇毒性。具魚毒性。對蜜蜂有毒性
20%芬化利可濕性粉劑	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	3,000	0.2-0.5 公斤	10	0.5	對水中生物有劇毒性。具魚毒性。對蜜蜂有毒性。

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1.5 公升	6	1.0	對蜜蜂有劇毒性。 對水中生物有劇毒性。
2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1.5 公升	6	1.0	對蜜蜂有劇毒性。 對水中生物有劇毒性。
5%賽滅寧水基乳劑	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,500	0.3-1 公升	6	2.0	對蜜蜂有毒性
10%賽滅寧可濕性粉劑	IRAC 3A	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	3,000	0.2-0.5 公斤	6	2.0	對蜜蜂有毒性
150g/L 賽洛安勃膠囊水懸混劑	IRAC 3A,28	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	4,000	0.1-0.4 公升	7	賽洛寧 0.5 剋安勃 0.5	對蜜蜂有劇毒性
5%因滅汀水溶性粒劑	IRAC 6	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	3,500	0.1-0.4 公斤	6	0.02	對蜜蜂有劇毒性
2.15%因滅汀水基乳劑	IRAC 6	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,500	0.3-1 公升	6	0.02	對蜜蜂有劇毒性
10%克凡派水懸劑 (禁止空中施藥)	IRAC 13	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1.5 公升	9	0.5	對蜜蜂有劇毒性。對水中生物有劇毒性。具魚毒性。 <u>禁止施用於水域</u> 。禁止大面積施藥。 <u>禁止空中施藥</u> 。具高鳥類毒性。
25%二福隆可濕性粉劑	IRAC 15	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,500	0.4-0.6 公斤	7	1.0	對蜜蜂有毒性
5%可芬諾水懸劑	IRAC 18	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	1,000	0.5-1.5 公升	7	1.0	

噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂徹底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。

18.4%剋安勃水懸劑	IRAC 28	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	2,500	0.2-0.6 公升	6	0.5	<u>具魚毒性</u>
35%剋安勃水分散性粒劑	IRAC 28	毒蛾類、夜蛾類、植食性瓢蟲類	5,000	0.1-0.3 公斤	6	0.5	<u>具魚毒性</u>
20%撲滅松乳劑	IRAC 1B	青椿象	-	2.5 公升	10	0.2	害蟲發生時開始施藥
50%馬拉松乳劑	IRAC 1B	瓜實蠅	800	-	7	1.0	<u>具魚毒性</u> 。開花結果後施藥

*具有相同作用機制，應避免同時使用或應輪替使用。

*⑤系統性農藥：植物局部施用藥劑後，藥劑可移行到其他植物組織。

*蔬菜-果菜類-茄科果菜類-甜椒、辣椒、枸杞、香瓜茄、樹番茄。

☆登記藥劑仍以防檢署公告為準，相關資訊可參考下列網站：

衛福部食品藥物管理署網頁



農藥資訊服務網



無人機管理系統(農藥代噴)



生物農藥查詢平台



外銷農產品用藥基準



噴灑農藥時應穿戴長衣褲、鞋、帽、護目鏡、防毒面具(口罩)，並注意風向，噴完農藥回家後，用肥皂澈底洗淨全身，以避免中毒，並為確保環境清潔，農藥空瓶不可亂丟棄。