



新聞資料

農業部高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 115029 號

中華民國 115 年 7 月 24 日

紅霞颱風逼近 高雄農改場籲請農友加強防範

根據中央氣象署最新預報，菲律賓東方熱帶性低氣壓 TD13 已於今晨成為第 12 號颱風「紅霞」。未來預計朝西北方向移動，於 7 月 24 日至 25 日影響臺灣地區，外圍環流將帶來豪大雨及強風，尤其東部地區及恆春半島影響最為明顯，南部山區也將出現局部大雨。高雄區農業改良場(以下簡稱高雄農改場)籲請農友密切注意氣象署最新預報資訊，及早完成防災準備以降低損害。

高雄農改場羅正宗場長提醒農友，颱風帶來之瞬間強降雨，易造成作物倒伏、落花、落果或裂果，應保持排水系統暢通，於風雨來臨前清理殘枝落果，確認排水溝無阻塞，以免淹水及後續病害發生。蓮霧修剪後之枝條，應儘速移除或粉碎，避免阻礙果園排水；木瓜果園，應確實清除畦溝間落葉及落果，並加強病害預防作業。若正值施用化學肥料期間，應分次減量，以免降雨後肥料流失並加重受損根系的負擔。

羅場長進一步指出，目前正值高屏地區二期水稻分蘗期，農友應保持排水暢通，並待颱風過後積水退去，植株挺立後再行灌溉。針對金煌芒果、番石榴及紅龍果等正值採收時期之果樹，請儘速採收適收果實，以降低損失風險。若為香蕉、棗及木瓜等易受風害倒伏之植株，應加強枝條及莖幹於支柱的固定，同時加固網室，避免設施設備損壞。蓮霧若已進入催花期，且採用全株包覆式蓋網催花，應密切注意颱風路徑，必要時提前卸網，避免枝葉破損。

連續降雨易誘發病害或生理障礙，建議木瓜可適當疏果以減輕植株負擔；紅龍果則於花謝後清除花瓣，並以噴施 62.5% 賽普護汰寧粒劑 2000 倍預防濕腐病。果菜類(瓜果、茄果及豆類)、葉菜類及芋頭在颱風來臨前，請盡快將適收品項採收。正值產期的果菜類容易發生疫病(俗稱水傷)或細菌性軟腐病，在風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀 1,000 倍水溶液以預防疫病，或施用廣效性之 27.12% 三元硫酸銅水懸劑，配合清園及田間衛生管理，可預防真菌及細菌性病害蔓延。

颱風前的預防措施是降低農作物災損的關鍵，高雄農改場已成立多項作物技術服務團，提供防颱、災後復耕與技術諮詢。如農友遇到種植或防災相關問題，技術人員將竭誠提供協助與建議。

● 高雄農改場技術服務團

https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=8959

聯絡人：李子易助理研究員
電話：08-7389158 轉 741



香蕉為易倒伏作物，應加強立支柱固定。



園區排水溝確保順暢，即時清除雜草、殘枝或落果，避免阻塞排水。



網室設施應加強固定，避免瞬間強風毀損防蟲網。



蓮霧正值催花準備期，必要時應卸下黑網，颱風後再重新覆蓋。



已達成熟可採收之芋頭，應儘快採收。



風雨過後各類病害易蔓延，圖為苦瓜同時遭受真菌及細菌病害危害。