新聞資料

農業部高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 115035 號　　中華民國 115 年 10 月 21 日

薔琵颱風逼近　高雄農改場籲請農友加強防範

根據中央氣象署最新預報，編號第 29 號強烈颱風「薔琵」朝西北西穩定移動，預計週五(23 日)靠近臺灣，屆時受到颱風及其外圍環流影響，風雨強度將持續增強且範圍擴大，高雄區農業改良場(以下簡稱高雄農改場)籲請農友密切注意氣象署最新預報資訊，及早完成防災準備以降低損害。

高雄農改場羅正宗場長提醒農友，颱風帶來之瞬間強降雨，易造成作物倒伏、落花、落果或裂果，應保持排水系統暢通，於風雨來臨前清理殘枝落果，確認排水溝無阻塞，以免淹水及後續病害發生。剛定植的百香果果園應注意排水；木瓜果園應確實清除畦溝間落葉及落果，預防病害發生，並加強低窪果園抽水設備等準備。若正值施用化學肥料期間，建議分次減量，以免降雨後肥料流失並加重受損根系的負擔。

羅場長進一步指出，正值採收期之果菜類、紅龍果及番石榴等，應適時收穫；棗已進入開花著果期，除加強枝條固定外，可將防蟲網覆上避免枝條折損；香蕉及木瓜等易受風害之植株，亦須加強枝條及莖幹固定；已修剪及催花準備期的蓮霧果園，應儘速移除或粉碎修剪後枝條，避免阻礙果園排水，如採用全株包覆式蓋網催花，應密切注意颱風路徑，必要時提前卸網，避免枝葉因摩擦造成破損。對於正在培植的大豆、毛豆、紅豆及胡麻等雜糧田區應做好排水疏通。

連續降雨易誘發病害或生理障礙，建議木瓜可適當疏果以減輕植株負擔；紅龍果則容易發生濕腐病，花謝後應清除花瓣，並噴施 62.5%賽普護汰寧粒劑 2000 倍預防。果菜類(瓜果、茄果及豆類)及葉菜類在颱風來臨前，盡快將適收品項採收。正值產期的果菜類容易發生疫病(俗稱水傷)或細菌性軟腐病，在風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀的 1,000 倍水溶液以預防疫病，或施用廣效性之 27.12%三元硫酸銅水懸劑，配合清園及田間衛生管理，可預防真菌及細菌性病害蔓延。

颱風前的預防措施是降低農作物災損的關鍵，高雄農改場已成立多項作物技術服務團，提供防颱、災後復耕與技術諮詢。如農友遇到種植或防災相關問題，技術人員將竭誠提供協助與建議。

- 高雄農改場技術服務團
https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=announcement&id=8959

聯絡人：李子易助理研究員
電　話：08-7389158 轉 741



積水嚴重之田區，農友可用抽水馬達抽離積水，避免作物根部遭長時間淹水而死亡。



香蕉為易倒伏作物，應加強立支柱固定。



棗正值小果期，除加強枝條固定外，可將防蟲網覆上避免枝條折損。



蓮霧正值催花準備期，必要時應卸下黑網，颱風後再重新覆蓋。



雜糧作物田區做好排水疏通。



正值採收期之瓜果類應盡快採收。