新聞資料

農業部高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 115039 號　　中華民國 115 年 11 月 25 日

近日降雨病害發生風險提高，籲請農友加強田間巡查及防治

近日受東北季風及水氣影響，高屏部分地區出現降雨，田間環境濕度增加，局部低窪或排水不良田區更易形成高濕條件，有利病原菌繁殖及侵染。高雄區農業改良場（以下簡稱高雄農改場）提醒農友，應依作物生育階段及田間環境，加強番茄、洋蔥、蓮霧及棗等作物病害監測，及時採取適當管理措施，以減少病害蔓延及產量損失

高雄農改場羅正宗場長說明各項作物重要病害與防治要點。一、番茄在降雨及葉面長時間濕潤的環境下，容易增加細菌性斑點病及早疫病發生風險，尤其植株生長茂密或通風不良的田區更應留意。應適度整枝，維持植株通風透光，並避免於雨天或葉片潮濕時進行田間作業，減少病原傳播；如有罹病葉片，應適時移除並妥善處理。二、洋蔥田區若因降雨而排水不良，容易造成幼苗生長受阻，並增加黃萎病等病害發生風險，黃萎病可發生在苗床及本田期，連作地更容易發生。因此罹病幼苗切勿移植到本田，死亡的植株殘體不可棄置於田區；可適度施用有機肥，強化植株根系發育，並應加強田區的水分管理，避免因積水造成病勢蔓延及加重。三、蓮霧則應留意疫病、炭疽病及黑腐病等果實病害，病原菌可殘存在枯枝落葉及病果上，並藉由雨水順著果柄滲入套袋內引發病害。須隨時清除罹病組織，套袋時應選用新袋，並仔細將袋口包覆完全。四、棗為防範害蟲，大都採網室栽培，通風較為不良，若連日陰雨，果園濕度升高，有利於疫病發生，感染源易因風雨由地面噴濺到作物上侵染。因此防治工作首重田間衛生，應徹底清除落葉病果，加強果園通風及排水。

高雄農改場提醒農友，留意天氣與田間變化，強化病害監測與田間衛生工作，並可在病害發生初期適時施用登記於該作物及防治對象的藥劑，用藥時應遵守使用方法及安全採收期。農友如在病蟲害鑑定及防治上仍有疑問，可洽高雄改場病蟲害診斷服務專線(08-7389060)，相關人員將提供協助。

- 高雄農改場作物安全用藥資訊 https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665

聯絡人：陳正恩
電　話：08-7746760

	
番茄細菌性斑點病在葉片上形成壞疽病斑	洋蔥田區排水不良可能使病害發生風險提高
	
蓮霧病原菌可殘留在葉片上並經由雨水飛濺傳播	炭疽病造成果水浸狀病斑