



品種栽培方式及應注意事項

- (一) 適栽地區與土壤：高屏及雲嘉南地區春、秋作均適宜。土壤宜選擇粉質壤土、壤土或砂質壤土，且富含有機質、排水良好之田地栽培。
- (二) 播種適期：高屏地區春作 1 月下旬～2 月下旬，秋作 9 月中旬～10 月上旬；雲嘉南地區春作 2 月下旬～3 月中旬，秋作 8 月中旬～9 月上旬。
- (三) 播種與栽培密度：毛豆栽培方式均以機械播種，推薦每公頃種子播種量為 145 公斤（31 萬株），播種時需注意土壤含水量是否適當，採作畦栽培，畦寬 84 公分，畦高約 20 公分，每畦種植二行，株距 7.5 公分，每穴播種 1 粒。
- (四) 肥料量與施用法：每公頃化學肥料（N-P₂O₅-K₂O）推薦施用量為 60-60-60 公斤，即每公頃施用硫酸銨 286 公斤，過磷酸鈣 333 公斤，氯化鉀 100 公斤。施肥方法以氮肥 35% 及磷鉀肥全量作基肥，其餘氮肥分別於播種後 15 天及結莢初期各施 30% 及 35%，亦可施用複合肥料 43 號（15-15-15）每公頃 400 公斤。若採用根瘤菌與種子拌種，每公頃氮肥施用量可調降為 40 公斤。
- (五) 雜草控制：播種前必須將田間雜草處理乾淨，播種後即噴萌前除草劑，以控制雜草發生，生育期間若雜草滋生，以田間管理機進行中耕除草或施用選擇性除草劑防治，而藥劑種類及用法可參考政府當年編印之植物保護手冊。