

# 薑荷屬種原蒐集與園藝性狀調查

許玉妹

Curcuma (薑黃屬或薑荷屬)具休眠性，在乾燥、低溫、短日環境進入休眠。在屏東地區約於10月中旬至11月上旬停止生長，地上部逐漸枯乾進入休眠。薑黃屬的花序為穗狀花序，發生於莖軸上或頂生於由莖軸基部抽出的花莖上。本場蒐集的 Curcuma 屬 32 種種原中，依生長習性可分為三大類：先抽花後長葉、先長葉後抽花、及只長芽未曾開花者。先抽花後長葉者計有 9 種，花期較早，約在 4 月底至 5 月初開始開花，花期持續至 6 月中旬，隨後只長新芽。這一類植株株高約 1.5-2.0 公尺，葉片長約 55-70 公分、寬約 15-18 公分；葉片互生，每芽約有 4-6 片葉片；切花長度約 35-50 公分，色彩鮮豔的粉紅或紫紅色的苞片是主要觀賞部位。先長新芽後開花者計有 12 種，花期約在 6 月至 8 月之間，不同品種間植株性狀及花序性狀差異頗大；株高約 0.65-2.3 公尺，葉片長約 32-80 公分、寬約 12-22 公分；葉片互生，每芽約有 3-6 片葉片；切花長度約 45-110 公分，苞片白色或粉紅至紫紅色。只長芽未曾開花者有 11 種，品種間園藝性狀如株高、葉片大小、每芽葉片數等差異大。