艷紫牡丹栽培技術建立

黃雅玲

艷紫牡丹原產於馬來西亞，為引進種野牡丹科植物，花色為特殊的藍紫色，賞花期可達全年，花苞數多，花朵陸續開放，觀賞價值極高。本試驗旨在蒐集引進種野牡丹科植物種原，並針對具有觀賞潛力的品種，建立栽培繁殖體系，提供農民利用。目前已蒐集野牡丹科引進種 9 個品種，篩選出艷紫牡丹並建立其繁殖栽培技術。

艷紫牡丹之繁殖以扦插為主，通常取植株頂端 2 個節位幼嫩枝條當插穗，扦插介質以泥炭土加蛭石（2：1）或泥炭土加珍珠石（2：1）均可，存活率可達 100% ，且植株生長勢佳；介質若添加細砂，植株生長勢較差。扦插後放置於 70% 遮陰網下，可促進生根，一般約 14 天即可長根，發根後應儘早定植於 6 吋盆中，以促進植株快速生長及避免葉片黃化。植株生育期須全日照，但忌浸水，可露地栽培，艷紫牡丹扦插約 8 個月即具商品價值。由於艷紫牡丹植株型態佳，未來可開發為觀賞盆栽花卉、庭園景觀樹種或綠美化植栽。